Smithsonian Institution
Libraries

GIFT OF
Marcia Brady Tucker

SUPPLEMENTUM

INDICIS ORNITHOLOGICI,

SIVE

SYSTEMATIS ORNITHOLOGIÆ.

STUDIO ET OPERA

JOANNIS LATHAM, M.D. S.R.S.

LONDINI:

PROSTAT APUD G. LEIGH, J. ET S. SOTHEBY,

YORK-STREET, COVENT-GARDEN.

M,DCCC,I.

Printed by Luke Hansard,
Great Turnstile, Lincoln's-Inn Fields.

SUPPLEMENTUM.

AVES.

Div. I. TERRESTRES.

Ordo I. ACCIPITRES.

Genus I. VULTUR.

1.
V.
auricularis. V. fuſcus, corpore ſubtus albido, capite colloque denudatis, gula tomentoſa.
L'Oricou, *Levaill. Oiſ.* i. p. 36. pl. 9.
Vultur auricularis, *Daudin. Orn.* i. p. 10. 111.
Sociable Vulture, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 11. No. 11.

Habitat in *Africa*, & inſignis magnitudinis, lat. ped. 10. *Caput* denudatum, carneum, ut in *V. Papa*, at nares non carunculatæ. *Roſtrum* & *pedes* fuſci: nidificat in rupibus a mari longe diſtantibus, ponens ova tria alba.

2.
V.
Kolbii. V. pallidus, collo denudato, torque albo, remigibus rectricibuſque nigris.
Le Chaſſe-fiente, *Levaill. Oiſ.* i. p. 44. pl. 10.
Vultur Kolbii, *Daudin. Orn.* i. p. 15. x.
Kolben's Vulture, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 12.

Magnitudo fere *V. auricularis*. Habitat in *Africa*, ubique frequentiſſimus in plateis oppidorum quiſquilia colligens: cadaveribus potiſſimum & ſtercore veſcitur, etiam teſtudinibus parvis quas integras devorat.

3. V. audax. V. corpore fuſco, orbitis pallidis, pedibus lanatis nigro maculatis.
Bold Vulture, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 10. No. 10.

Habitat in *Nova Hollandia*, & inter majores numerandus: victitans quadrupedibus mediocribus, & ferox intrepide etiam hominibus reſiſtit: *roſtrum* pallidum apice nigro.

4. V. californianus. V. niger, roſtro albido, capite colloque denudatis pallidis, torquis pectoriſque plumis lanceolatis.
Vultur californianus, *Nat. Miſc.* v. 10. pl. 301.
Californian Vulture, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 3. No. 2.

Hæc avis magnitudine pene par *Grypho* eſt: torquis & pedes nigri: alæ complicatæ ultra apicem caudæ extendunt.
E California in *Angliam* detulit hunc vulturem *D. Menzies*, qui conſpici poſſit in *Muſeo Britannico*.

Genus II. FALCO.

1. F. vulturinus. F. niger tibiis pennatis, roſtro pedibuſque flaveſcentibus.
Le Caffre, *Levaill. Oiſ.* i. p. 28. pl. 6.
Falco vulturinus, *Daudin. Orn.* ii. p. 53.
Vulturine Eagle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 15. No. 1.

Habitat in *Africa*, *Caffraria*, et inter rariores habetur: magnitudo *F. Chryſaætos*, victitat cadaveribus, hinc fœtidum odorem ſpirans, etiam voraciſſimus oves invadit et capit. *Vulturibus* affinis, at collum plumis tectum.

2. F. bellicoſus. F. fuſcus cervice varius, ſubtus albus, tibiis pennatis, roſtro pedibuſque pallidis.
Le Griffard, *Levaill. Oiſ.* i. pl. 1.
Falco bellicoſus. *Daudin. Orn.* ii. p. 38. ii.
Martial Eagle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 16. No. 2.

Habitat

HABITAT in *Africa, Caffraria:* pond. 25.—30. libr. lat. ped. 7. poll. 5. *fem.* lat. ped. 8. poll. 7.—*remiges* ſecundæ exteriores & rectrices albido nigroque faſciatæ.

3. F. occipitalis. F. criſtatus fuſcus, tibiis pennatis, macula alarum baſique caudæ albo variegatis.

Falco occipitalis, *Daud. Orn.* ii. p. 40. iii.
Le Huppard, *Levaill. Oiſ.* i. pl. 2.
Occipital Eagle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 17. No. 3.

HABITAT ad *Caput bonæ Spei: F. Vulturino* paulo minor: *occiput* eleganter criſtatum: *roſtrum* cæruleſcens: *pedes* flavicantes.

4. F. Albicilla. Var. F. obſcurus, remigibus ſaturate fuſcis, uropygio caudaque albo-cineraſcentibus.

Falco albicilla, *Ind. Orn.* i. p. 9. 2. Var.?
Cinereous Eagle, *Lath. Syn.* i. p. 33. 18.—*Id. Sup.* p. 18. No. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia:* habitus *albicillæ: roſtrum* nigrum: *corpus* fuſcum ſubtus dilutius: *uropygium* & *cauda* cinereo-alba: an varietas *F. albicillæ.*

5. F. tigrinus. F. fuſcus ſubtus albus, femoribus fuſco maculatis, tectricibus alarum inferioribus nigro faſciatis.

Falco tigrinus, *Beſek. Vog. Kurl.* S. 10. 11.—1 *Taf.* 2.—*Allg. Ueb. d. Vog.* ii. S. 676.
Tiger Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 19. No. 6.

HABITAT in *Germania:* magnit. *F. Chryſaëtos: cera* cærulea: *irides* & *pedes* flavi: *caput* & *pectus* fuſceſcens: *vertex* & *nucha* nigra: *remiges* nigræ: *rectrices* faſciis 3 anguſtis nigris notatæ: *alæ* ſubtus faſciis tigrinis nigris: ſæva & impavida ſpecies.

6. F. germanicus. F. ruſo-albus, dorſo alis caudaque fuſcis, rectricibus faſciis 4 pallentibus.

Der rothlichweiſſe Falke, *Beſek. Vog. Kurl.* S. 10. 12. a und 13. b.—*Allg. U. d. Vog.* i. *Zuſ.* S. 676. 120.
Courland Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 19. No. 7.

Habitat in *Germania*, *F. tigrino* minor: *cera*, *irides*, & *pedes* flavi: *caput*, *collum*, & *pectus* ſtriis longitudinalibus fuſcis: pennæ femora tegentes apicibus macula nigra.

7. F. deſtructor.

F. criſtatus niger faſciis griſeis, capite griſeo, corpore ſubtus albido.
Falco deſtructor, *Daud. Orn.* ii. p. 60. xxxii.
Grand Aigle de la Guiane, *Encycl. Method.*
Deſtructive Eagle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 20. No. 9.

Habitat in *Guiana:* long. ped. 3. poll. 2.:—*caput* ſuperius griſeo-nigricans: *occipitis* pennæ longiſſimæ: *corpus* nigrum zonis ſubgriſeis notatum: *pectus* & *abdomen* griſeo-alba: *remiges* & *rectrices* nigra: *tibiæ* plumoſæ digitis flavis.

8. F. albeſcens.

F. ſubſcriſtatus albus fuſco varius, remigibus rectricibuſque albo nigroque faſciatis.
Le Blanchard, *Levaill. Oiſ.* i. pl. iii.—*Daudin. Ornith.* ii. p. 45.
Noiſy Eagle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 21. No. 10.

Habitat in *Africæ* ſylvoſis, prædatur palumbis, nidificat in excelſis arboribus ova 2 ponens alba: *roſtrum* cæruleſcens: *pedes* flavicantes, tibiis lanugine alba veſtitis.

9. F. ecaudatus.

F. niger, alis pallidis, dorſo caudaque breviore rufis.
Le Bateleur, *Levaill. Oiſ.* i. p. 31. pl. 7. & 8.
Falco ecaudatus, *Daudin. Orn.* ii. p. 54.
Short-tailed Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 21. No. 11.

Magnitudo inter *F. oſſifragum* & *haliætum:* habitat in *Capitis Bonæ Spei* interioribus: *mas* & *femina* individui comites ſimul cadaveribus victitant; non raro *oves* & *gazellas* prædantes: hæc avis inter volandum alas fortiter quatit, ut ſolet columba percuſſor: *cauda* breviſſima: *corpus feminæ* & *juniori avi* fuſcum, remigibus caudaque nigricantibus.

10. F. Bacha.

F. fuſcus ſubtus albo maculatus, occipite criſtato, faſcia rectricum alba.
Le Bacha, *Levaill. Oiſ.* i. p. 68. pl. 15.—*Daudin. Ornith.* ii. p. 43.
Bacha Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 22. No. 12.

Habitat

HABITAT in *Capitis Bonæ Spei* aridis & incultis: prædatur *caviam capenſem & lacertas: roſtrum & pedes* pallide flavi.

Magnitudo *Buteonis*, pennæ verticis totius albo nigroque variæ ad occiput elongatæ: *cauda* nigricans, medio faſcia alba.

11. F. Tachardus.

F. fuſcus, ſubtus flaveſcens fuſco varius, cauda faſciata, tibiis maculatis.
Le Tachard, *Levaill. Oiſ* i. p. 82. pl. 19.
Falco Tachardus, *Daud. Orn.* ii. p. 164. cxxxvi.
Tachard Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 25. No. 17.

HABITAT in *Africa* ad ripas fluviorum, habitus *Buteonis* at minus: *cauda* longiore fuſca faſciis nigricantibus: *femora* pennata: *roſtrum* nigricans: *pedes* rubicundi: *F. Lagopo* affinis.

12. F. Chicquera.

F. cæruleſcens ſubtus albus, vertice nuchaque ferrugineo-rufis, cauda faſcia nigra.
Falco cirrhatus, *Ind. Orn.* i. p. 36. Var.?
Le Chicquera, *Levaill. Oiſ.* i. p. 128. pl. 20.—*Daudin. Orn.* ii. p. 121. xciii.
Chicquera Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 27. No. 19.

HABITUS & ſtatura *F. cirrhati*, an ſatis diſtincta: *caput* non criſtatum: abdomen & *femora* faſciis plurimis abruptis: verſus apicem *caudæ* tænia lata nigra: *roſtrum* flavum ſuperius apice nigro, inferius truncatum: pedes flavi.

13 F. Paraſiticus.

F. cauda forficata, corpore ferrugineo, cera cærulea, roſtro pedibuſque flavis.
Le Paraſite, *Levaill. Oiſ.* i. p. 88. pl. 22.
Falco Paraſiticus, *Daudin. Orn.* ii. p. 150. cxxii.
Paraſite Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 30. No. 25.

HABITAT in *Africa, Caffraria:* habitus *F. Milvi* at minor: *cauda* minus forficata: *genæ* & *gula* albidæ: *cauda* fuſca faſciis ſaturatioribus: impavida avis, nidificat in arboribus & rupibus, ponens ova 4 rufo maculata.

F. nigricans

14. F. Buzon.

F. nigricans rufo varius, ſubtus rufus, rectricibus nigris medio faſcia interrupta alba.
Le Buzon, *Levaill. Oiſ.* i. p. 86. pl. 21.
Falco Buzon, *Daud. Orn.* ii. p. 168. cxlii.
Hobby Buzzard, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 31. No. 26.

Habitat in *Cayana*, magnitudine *F. Cyanei*: *rectrices* nigricantes elongatæ medio faſciola e maculis confertis: *roſtrum* nigrum: *cera* lata flava: *pedes* flavi.

15. F. Buſarellus.

F. faſciatus ſupra rufo-fuſcus, ſubtus flaveſcens, remigibus nigris.
Le Buſeray, *Levaill. Oiſ.* i. p. 84. pl. 20.
Falco Buſarellus, *Daudin. Orn.* ii. p. 168. cxli.
Buzzaret, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 32. No. 27.

Habitat in *Cayana*, magnitudo *F. æruginoſi*: *roſtrum* nigrum: *pedes* flavi.

16. F. melanopterus.

F. pedibus plumoſis, corpore cæruleſcente ſubtus albo, tectricibus alarum nigris.
Le Blac, *Levaill. Oiſ.* i. p. 147. pl. 36. 37.
Falco melanopterus, *Daud. Orn.* ii. p. 152. cxxiv.
Black-winged Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 28.

Habitat in *Africa*, *India*: magnitudo *tinnunculi*: *corpus* pennis cæruleo-griſeis veſtitum margine rufis: *cauda* ſubforcipata: regio oculorum nigra: *roſtrum* nigrum: *pedes* breves flavi.
Juniore ave *vertex* rufo varius: *pectus* toto-rufum.

17. F. vocifer.

F. ferrugineo-fuſcus, capite collo pectore caudaque albis.
Le vocifer, *Levaill. Oiſ.* i. pl. 4.
Aigle vocifer, *Daud. Orn.* ii. p. 65. xxxv.
Aigle nonette, *Gaby*, *Voy. en Nigritie.*
Piſcivorous Eagle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 33. No. 29.

Habitat ad *Caput Bonæ Spei*, maris littora frequentans; piſces prædans uti *haliætus*, quam ſtatura & magnitudine æmulatur: *roſtrum* cæruleſcens:

ruleſcens: *pedes* flavi: *cauda* brevis vix apicem alarum complicatarum attingit.

18. F. Blagrus. F. fuſcus, capite collo cauda corporeque ſubtus toto-albis.
Le Blagre, *Levaill. Oiſ.* i. pl. 5.
Falco Blagrus, *Daudin. Orn.* ii. p. 70.
Blagre Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 34. No. 30.

Habitat in *Africa*, ad ripas fluviorum *Capitis Bonæ Spei*, procul a mari ſatis frequens: magnitudo *F. vociferi:* ſtatura & moribus *F. Haliæto* ſimillimus, & pariter piſcibus victitans: an ejuſdem varietas?

19. F. ranivorus. F. fuſcus ſubtus albido varius, femoribus criſſoque ruſo-ferrugineis.
Le Grenouillard, *Levaill. Oiſ.* i. p. 95. pl. 23.
Falco ranivorus, *Daudin. Orn.* ii. p. 170. cxliv.
Ranivorous Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 35. No. 33.

Habitat ad *Cap. B. Spei:* nidificat inter arundines, ponens *ova* 3—4 alba: magnitudo *F. æruginoſi: vertex* nigricans: *collum* lateribus & *humeri* albo varii: *cauda* elongata faſciis ſaturatioribus: *roſtrum* nigrum: *pedes* graciles flavi.

20. F. teſtaceus. F. teſtaceus ſubtus albus, abdomine rufeſcente, remigibus albo maculatis, cauda alba faſciis nigricantibus.
Falco teſtaceus, *Daudin. Orn.* ii. p. 125. ci.
Teſtaceous Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 36. No. 35.

Habitat in *Java*, magnitudine *F. Palumbarii: caput* & *corpus* totum ſupra fuſco-teſtaceum: *uropygium* ſubferrugineum: *gula* & *collum* ſubtus album: *pectus* teſtaceo-album: *abdomen* rufum: *remiges* nigræ intus albo maculatæ: *cauda* ſupra fuſca, ſubtus albida faſciis 5 nigricantibus.

21. F. ornatus. F. criſtatus fuſcus, ſubtus ruſo-albus, gula alba, femoribus albo nigroque faſciatus.
L'Autour huppé, *Levaill. Oiſ.* i. p. 114. pl. 26.—*Daudin. Orn.* ii. p. 77. xlv.
Creſted Goſhawk, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 37. No. 38.

Habitat

HABITAT in *Cayana:* habitus *F. Palumbarii* at major: *occiput* pennis valde elongatis nigris: lateribus colli ſtriga nigra: *cauda* elongata, *rectricibus* fuſceſcentibus faſciis nigris.

22. F. Mauduyti. F. criſtatus faſciatus, ſupra fuſco-nigricans, ſubtus albus, medio alæ cinereo-griſeo.
Falco Mauduyti, *Daud. Orn.* ii. p. 73. xl.
Grand Autour de Cayenne, *Mauduit, Enc. Meth.*
Mauduit's Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 38. No. 39.

HABITAT in *Cayana:* long. ped. 2.—*roſtrum* & *cera* nigra: *cauda* elongata griſeo & nigro quater faſciata: *pedes* flavi.
Femina major, non criſtata.

23. F. Guianenſis. F. criſtatus albus, remigibus rectricibuſque nigro faſciatis.
Falco Guianenſis, *Daudin. Orn.* ii. p. 78. xlvi.
Guiana Goſhawk, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 38. No. 40.

HABITAT in *Guiana:* long. poll. 22.—*occipitis* pennæ elongatæ, apice exterioris macula nigra: *pedes* nudi, longi, flavi.

24. F. rufiventris. F. fuſcus ſubtus rufus, capite fuſco-cinereo, gula alba lateribus rufis.
Falco rufiventris, *Daud. Orn.* ii. p. 86. liv.—*Mauduit, Encycl. Meth.* p. 687. col. i.
Rufous-bellied Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 39. No. 41.

HABITAT in *Cayana*, magnitudine *Niſi: roſtrum* nigrum: *pedes* flavi.

25. F. hyemalis. Var. F. cinereo-fuſcus, ſubtus albus maculis ferrugineis, uropygio albo, pectore ferrugineo.
Falco hyemalis, *Ind. Orn.* i. p. 35. 78. Var.
Falco europogiſtus, *Daudin. Orn.* ii. p. 110. lxxviii.
Northern Falcon, *Gen. Syn.* i. p. 79. Var. p. 39. No. 42.

HABITAT in *America*, provincia *Noveboracenſi:* long. poll. 16.—*caput* cinereum ferrugineo varium: *gula* alba: *dorſum* cinereo-fuſcum: *pectus* ferrugineum albido varium: *corpus* ſubtus album ſingulis plumis 2 vel 3 maculis cordiformibus ferrugineis: *cauda* cinereo-fuſca apice ſaturatiore, ſubtus griſeo-alba faſciis fuſcis obſoletis.

F. cera

26. F. muſicus. F. cera pedibuſque rubris, corpore cæruleo-caneſcente, abdomine albido faſciis numeroſis.
Le Faucon Chanteur, *Levaill. Oiſ.* i. p. 117. No. 27.
Falco muſicus, *Daudin. Orn.* ii. p. 116. lxxxviii.
Chanting Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 40. No. 44.

Habitat in *Caffraria*, magnitudine *F. Communis*, coloribus *F. Cyanei*, at ſatis diſtincta: cauda valde cuneata rectricibus exterioribus albo faſciatis.

Mas voce canora tempore incubationis longe auditur.

27. F. Acoli. F. pedibus elongatis, corpore cæruleſcente ſubtus lineato, cauda alba.
L'Acoli, *Levaill. Oiſ.* i. p. 126. pl. 33.
Falco Acoli, *Daudin. Orn.* ii. p. 176. cli.
Long-legged Hen Harrier, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 42. No. 45.

Habitat ad *Cap. Bonæ Spei* ripas fluviorum, magnitudine *F. Cyanei*, ejuſdem fere coloris, at variat *pedibus* & *cauda* longioribus: *abdomen* & *femora* albida lineis incurvis nigricantibus: *uropygium* albidum & *cauda*: *roſtrum* nigrum: *pedes* flavi.

28. F. axillaris. F. corpore cæruleſcente ſubtus albo, ſuperciliis & axillaribus nigris.
Axillary Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 42. No. 46.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine & habitu *F. Cyanei*: *roſtrum* nigrum: *irides* fuſci: *pedes* flavi.

29. F. rupicolus. F. dorſo ruſo maculis nigris, ſubtus ruſo-albidus ſtriis rufis: cauda faſciis fuſcis.
Le Montagnard, *Levaill. Oiſ.* i. p. 144. pl. 35.
Falco rupicolus, *Daudin. Orn.* ii. p. 135. cix.
Rufous-backed Keſtril, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 45. No. 49.

Habitat ad *Caput B. Spei*: *Tinnunculo* paulo major: *corpus* ſupra rufum maculis ſublunatis nigris: *caput* ruſo-fuſcum: *corpus* ſubtus ruſo-album ſtriis nigris: *remiges* nigræ: *cauda* ruſo-alba faſciis 6 vel 7 fuſcis: *roſtrum* nigrum: *pedes* flavi.

30. F. Subbuteo major
F. fasciatus supra nigricans subtus rufo-albus, genis nigris, rectricibus fusco cinereoque fasciatis.
Falco subbuteo major, *Allg. U. d. Vog.* ii. *Zusass.* p. 660. 29. taf. 1.—*Id. G. N. Deutsch.* ii. S. 315. 19.
Greater Hobby, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 47. No. 51.

Habitat in *Germaniæ* pinetis, magnitudine *Coracis: caput* & *collum* fusco-nigrum: *genæ* nigræ: *corpus* supra nigro-cæruleſcens fasciis obsoletis fuscis, cinereo, & rufo-griseis: subtus albidum fasciis fuscis: *peregrino* similis, at distincta avis.

31. F. Gabar.
F. fuscus subtus griseo-cæruleſcens, abdomine albo fasciis fuscis.
Le Gabar, *Levaill. Ois.* i. p. 136. pl. 32.
Falco Gabar, *Daudin. Orn.* ii. p. 87. lvi.
Red-legged Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 47, No. 52.

Habitat in *Africæ* interioribus, magnitudine *F. Nisi: abdomen* & *femora* alba fasciis fuscis: *tectrices caudæ* supra & infra albæ: *rectrices* fuscæ fasciis saturatioribus: *rostrum* nigrum: *cera* & *pedes* rubri.

32. F. minullus.
F. fuscus subtus albus, pectore striis abdomine fasciis fuscis.
Le Minule, *Levaill. Ois.* i. p. 140. pl. 34.
Falco minullus, *Daudin. Orn.* ii. p. 88. lvii.
Dwarf Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 48. No. 53.

Habitat in *Africa*, parva avis, in hoc genere forte minima: *remiges* intus albo fasciatæ: *cauda* fasciis obsoletis: *rostrum* nigrum: *cera* & *pedes* flavi.

33. F. tibialis.
F. griseo-fuscus, gula alba, corpore subtus rufescente striis fuscis, femoribus nigris.
Le Faucon à culotte noire, *Levaill. Ois.* i. p. 126. pl. 29.—*Daudin. Orn.* ii. p. 120. xcii.
Black-thighed Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 49. No. 54.

Habitat in *Africæ* montosis: *caput* superius nigricans: *remiges*, *rectrices*, *femoraque* nigra: *rostrum* cæruleſcens, mandibula inferiore apice truncata: *cera* & *pedes* flavi.

34. F. Jackal.

F. nigricans ſubtus albo varius, pectore caudaque brevi rufis.
Le Rounoir, *Levaill. Oiſ.* i. p. 73. pl. 16.
Falco Jackal, *Daudin. Orn.* ii. p. 161. cxxxiii.
Jackal Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 49. No. 55.

Habitat ad *Cap. B. Spei*, magnitudine *Buteonis*: *remiges* primores faſciis pallidis, ſecundariæ extus albæ: *rectrices* verſus apicem macula nigra: prædatur *mures*, *talpas*.

35. F. Deſerto-rum.

F. rufus, ſubtus pallidus ſtriis obſoletis, cauda faſciis obſcuris, remigibus nigris.
Le Rougri, *Levaill. Oiſ.* i. p. 77. pl. 17.
Falco deſertorum, *Daudin. Orn.* ii. p. 162. cxxxiv.
Deſert Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 50. No. 56.

Habitat in deſertis *Africæ*, rarius in cultis: victitat *muribus*, *talpis*: vox *Buteonis*, magnitudine ei cedens.
Mas & *femina* ſimul prædant: *roſtrum* & *pedes* flavi.

36. F. Niſus.

F. fuſcus, vertice cano, abdomine albo rufo undulato, pedibus flavis.
Falco Niſus, *Ind. Orn.* i. p. 44. 107. Var. δ.
Sparrow Hawk, *Gen. Syn.* p. 99. 85.—*Id. Sup.* p. 26. Var. C.—*Id. Sup.* ii. p. 51. No. 57.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine & facie *F. Niſi*: long. poll. 18.—*nucha* ferrugineo-rufa: *cauda* longa faſciis numeroſis pallidis: *alæ* complicatæ vix ultra baſin extendunt: *roſtrum* cæruleſcens: *irides* flavi.

37. F. Tachiro.

F. fuſcus, ſubtus albus maculis lunatis, rectricibus faſciatis.
Le Tachiro, *Levaill. Oiſ.* i. p. 100. pl. 24.
Falco Tachiro, *Daudin. Orn.* ii. p. 90. lix.
Speckled Sparrow-hawk, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 51. No. 58.

Habitat in *Africa*, ad *Caput Bonæ Spei*: magnitudine fere *F. Palumbarii*: *caput* & *collum* albo varia: *remiges* apice albæ: *cauda* elongata fuſca faſciis ſaturatioribus: *cera* cæruleſcens: *pedes* flavi.

38. F. Sonninensis.

F. cauda ſubforcipata, corpore cinereo ſubtus albo, tibiis plumoſis. *Sonnini.*

Sonnini's Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 52. No. 59.

Habitat in *Ægypto* ſatis frequens: longit. fere ped. 1.:—*roſtrum*, *cera*, *irides*, & *pedes* flavi: *rectrices* intermediæ paulo breviores: *remiges* ultra apicem caudæ extendunt: *ſinciput* album.

39. F. melanops.

F. ſupra nigricans, ſubtus ferrugineus lineis cinereis tranſverſis, orbitis nigris.

Black-eyed Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 52. No. 60.

Habitat in *Nova Hollandia:* long. poll. 34.:—*caput* & *collum* cinerea: circa oculos rufum, *orbitis* nigris: *roſtrum* nigrum.

40. F. radiatus.

F. nigro radiato-maculatus, corpore ferrugineo, alis caudaque elongata fuſcis.

Radiated Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 53. No. 61. tab. 121.

Habitat in *Nova Hollandia:* longit. poll. 22.:—*corpus* totum læte ferrugineum, faſciis maculiſque difformibus nigris: *cauda* longiſſima rotundata, faſciis 8, 9 nigris: *roſtrum* nigrum: *pedes* cærulei.

41. F. connivens.

F. badius ſubtus flaveſcens maculis fuſcis, cervice & axillaribus albo maculatis.

Winking Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 53. No. 62.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *F. Cyanei: remiges* & *rectrices* badio & albo faſciatæ: *tibiæ* plumis tectæ: *roſtrum* pallidum: *irides* et *digiti* flavi.

42. F. diſcolor.

F. griſeo-nigricans ſubtus ferrugineus, tectricibus inferioribus alarum & caudæ albis.

Falco diſcolor, *Act. Soc. N. H. de Paris*, i. pl. 1. p. 911. 4.
Der bunt Falke, *Allg. U. d. Vog.* ii. S. 680. 128.
Ruſty and grey Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 53. No. 63.

Habitat in *Cayana.*

F. fuſcus

43. F. pacificus. F. fuſcus nigro maculatus, ſubtus flaveſcens lineis nigris, capite colloque albis
Pacific Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 54. No. 64.

Habitat in *Nova Hollandia*: long. poll. 16—18.: *roſtrum*, *irides*, & *pedes* flavi: *cauda* elongata faſciis 7 vel 8 obliquis nigris.

44. F. lunulatus. F. fuſcus, pectore maculoſo, fronte lunula colli corporeque ſubtus flaveſcentibus.
Lunated Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 54. No. 65.

Habitat in *Nova Hollandia*: longit. poll. 12.:—*gula* & utrinque ſub oculis flaveſcens: *abdomen* maculis crebris nigricantibus notatum.

45. F. clarus. F. fuſcus, capite & corpore ſubtus albo, vertice & abdomine medio cæruleſcentibus.
Fair Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 54. No. 66.

Habitat in *Nova Hollandia*: *roſtrum* fuſceſcens: *irides* & *pedes* flavi: variat *nucha* nigro maculata, *uropygio* cæruleſcente, *cauda* apice pallida.

Genus III. STRIX.

1. Str. paluſtris. * Auriculatæ, pennis auricularum inſtar extantium.
S. capite aurito pennis ſex, corpore albo griſeo fuſcoque vario, torque flaveſcente maculis fuſco-rufis.
Strix Paluſtris, Die Sumpfeule, *G. N. Deutſch.* 2. 344.—*Allg. Ueb. d. Vog.* i. *Zuſaſs.* p. 683. 16. β.—*Gr. Muſt.* p. 82.
Marſh Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 58. No. 4.

Habitat in *Pomerania* & *Thuringia*, magnitudine *Coracis*: long. poll. 8. lin. 10.:—*corpus* ſupra albo griſeo & fuſco varium, ſubtus magis albidum: *collum* circumdat torquis flaveſcens maculis choavæ colore notatus: *cauda* albida faſciis 5 obſcuris.

S. capite

2. Str. albifrons. S. capite aurito, corpore fuſco ſubtus flaveſcente, facie alba.
White-fronted Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 58. No. 5.

Habitat in *Amer. Sept.* long. poll. 8.:—*roſtrum* nigrum: *corpus* ſupra ferrugineo-fuſcum tectricibus alarum maculis rarioribus albis: ſubtus luteſcens faſcia pectoris fuſceſcente: *remiges* 5 primores extus ſecundariæ intus macula alba notatæ: *rectrices* fuſcæ macula alba.

Frons, gula, regioniſque periopthalmicæ margo poſticus alba: variat corpore minore, regione periopthalmica unicolore. *Muſ. D. Davies.*

** Inauriculatæ.

3. Str. candida. S. capite lævi, corpore albo maculis alarum diſtantibus nigris.
La Chouette blanche, *Levaill. Oiſ.* i. p. 172. pl. 45.
Strix nivea, *Daudin. Orn.* ii. p. 190.
Ermine Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 60. No. 7.

Magnitudo *Str. Nyctææ*, ſpecie tamen diverſa: *caput* magnum corpore validiore: *alæ* complicatæ longitudine caudam ſuperant: *pedes* ad ungues uſque lanati: *roſtrum* nigrum.

4. Str. Choucou. S. pallide fuſcus ſubtus albus, cauda cuneata lineis tranſverſis albis.
Le Choucou, *Levaill. Oiſ.* i. p. 151. pl. 38.
Strix Choucou, *Daudin. Orn.* ii. p. 186.
Falconine Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 61. No. 9.

Habitat in *Africa:* habitus *Str. Funereæ*, capite parvo acciptrino: regio periopthalmica & narium alba: *cauda* longa cuneiformis, *rectricibus* extus lineis 10—12 tranſverſis albis notatis: *roſtrum* parvum, nigrum.

5. Str. niſuella. S. corpore fuſco rufo alboque vario, cauda cuneata, pennis periopthalmicis apice nigris.
Le Choucouhou, *Levaill. Oiſ.* .i p. 157. pl. 39.
Strix niſuella, *Daudin. Orn.* ii. p. 187.
Variegated Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 62. No. 10.

Habitat

Habitat in *Africa*, magnitudine *Str. Otus: corpus* fuſcum ſupra maculis rufo-nigricantibus & albis, ſubtus lunulis varium: facies albida, apicibus pennarum nigris.

6. Str. Huhula.

S. albo faſciata corpore cinereo, alis fuſcis, cauda faſciis tribus albis.
Le Huhul, *Levaill. Oiſ.* i. p. 167. pl. 41.
Strix Huhula, *Daudin. Orn.* ii. p. 190.
Faſciated Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 62. No. 11.

Habitat in *Africa*, magnitudine *Str. Ululæ: corpus* cinereum lineis numeroſis tranſverſis albis, ſubtus undulatum albido faſciatum: *cauda* cuneata faſciis tribus obliquis albis: *roſtrum*, *irides*, & *pedes* flavi.

7. Str. griſeata.

S. varia, corpore ſupra fuſco rufoque, ſubtus rufo-alba, tectricibus alarum caudaque albo maculatis: ſuperciliis albis.
La Chouette à Aigrette blanche, *Levaill. Oiſ.* i. p. 169. pl. 43.
Strix griſeata, *Daudin. Orn.* ii. p. 207.
Supercilious Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 63. No. 12.

Habitat in *Guiana*, magnitudine *Str. Otus:* regio periopthalmica vix conſpicua, ſupra oculos vitta alba ad axillas utrinque fere ducta: *roſtrum* mediocre flavum: *pedes* nigricantes.

8. Str. Georgica.

S. faſciata capite lævi, corpore fuſco ſubtus albo, regione periopthalmica albo annulata.
Georgian Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 64. No. 13.

Habitat in *Georgia Americana:* long. poll. 16½.:—magnitudo *Str. Flammeæ: roſtrum* flavum: *gula* & *pectus* fuſcum faſciis albidis: *abdomen* albidum maculis fuſco-rubris: *femora* albida punctis nigricantibus.

9. Str. Boobook.

S. capite lævi, corpore ſupra fuſco ſubtus ferrugineo longitudinaliter maculato.
Boobook Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 64. No. 14.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *Stridulæ: corpus* ſupra fuſco-ferrugineum maculis flaveſcentibus: *gula* flava rufo maculata.

S. capite

10. Str. nudipes. S. capite lævi, corpore ſupra fuſco albo maculato, ſubtus albo maculis lyriformibus fuſcis.
Strix nudipes, *Daudin. Orn.* ii. p. 199.
Bare-legged Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 65. No. 16.

Habitat in *Cayana:* long. poll. 7.:—*corpus* ſupra fulvo-fuſcum, macula lateribus colli alba: *tectrices alarum* minores albo maculatæ: *corpus* ſubtus album ſtriis longitudinalibus fuſcis: *pedes* nudi, fuſci.

11. Str. phalænoides. S. capite lævi, corpore fulvo, tectricibus alarum inferioribus albo maculatis, ſubtus albo rufoque vario, pedibus hirſutis.
Strix phalænoides, *Daudin. Orn.* ii. p. 206.
Booted Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 66. No. 17.

Habitat in *America* inſula *Trinitatis:* longit. poll. 6.:—*roſtrum* nigricans: *tectrices alarum* inferiores maculis 6 albis notatæ: *corpus* ſubtus & *genæ* albo & rufo variæ: *tibiæ* & *digiti* plumoſi rufeſcentes.

12. Str. Tengmalmi. S. capite lævi, corpore fuſco-albo vario, vertice & genis albo punctatis.
Strix Tengmalmi, *Ind. Orn.* i. p. 64. 42. Var?
Var. Le Chevechette, *Levaill. Oiſ.* i. p. 176. pl. 46.
Strix Puſilla, *Daudin. Orn.* ii. p. 205.
Dwarf Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 66. 18. Var.

Habitatio dubia, *Str. Paſſerina Minor: corpus* fuſcum, ſubtus albo varium: *vertex* & *genæ* ſub oculis punctis numeroſis albis: regio oculorum & *gula* alba: *remiges* albo maculatæ vix baſin caudæ attingunt: varietas *Str. Tengmalmi.*

13. Str. Sinenſis. S. capite lævi, corpore ſupra caſtaneo ferrugineo vario, gula alba, abdomine lineis tranſverſis obſcuris.
China Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 368.

Habitat in *China*: long. poll. 17.:—*nucha* & *cervix* maculis albis & nigris notata: *remiges* & *rectrices* faſciis fuſco-caſtaneis.

S. capite

14. Str. undulata. S. capite lævi, corpore rufo-fuſco, abdomine albo undulato, tectricibus alarum remigibuſque albo marginatis.
Undulated Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 368.

Habitat in Inſula *Norfolk* maris *Pacifici*: long. poll. 12.:—*roſtrum* validiuſculum cæruleum: *pedes* nudi flavi.

Ordo II. PICÆ.

Genus IV. LANIUS.

1. L. collaris. Lanius collaris, *Ind. Orn.* i. p. 69. 10.
Le Fiſcal, *Levaill. Oiſ.* ii. p. 35. pl. 61. 62.
Collared Shrike, *Lath. Syn.* i. p. 163. 7.—*Id. Sup.* ii. p. 68. No. 1.

Habitat ubique in *Africa*.

2. L. Collurio. Lanius Collurio, *Ind. Orn.* i. p. 69. 11.—*Spalowſk. Vog.* 2. tab. 5.—*Hiſt. Prov.* ii. p. 335.
L'Ecorcheur male & de jeune age, *Levaill. Oiſ.* ii. p. 50. pl. 64.
Red-backed Shrike, *Gen. Syn.* i. p. 167. 25.—*Id. Sup.* ii. p. 69. No. 2.

Habitat ad *Cap. B. Spei*: in *Egypto*.

3. L. picatus. Lanius picatus, *Ind. Orn.* i. p. 73. 20.
Lanius Leverianus, *Muſ. Lev.* p. 241. t. 59.
Corvus Collurio, *Daud. Orn.* ii. p. 246.
La Pie Piegrieſche, *Levaill. Oiſ.* ii. p. 33. pl. 60.
Magpie Shrike, *Gen. Syn.* i. p. 192. 49.—*Id. Sup.* i. p. 54.—*Id. Sup.* ii. p. 70. No. 3.

Habitat in *Cayana*.

4.
L.
torquatus. L. fuſcus ſubtus albo nebuloſus, loris ferrugineis.
Clouded Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 73. No. 10.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *roſtrum* cæruleſcens: *cauda* elongata.

5.
L.
dubius. L. cinereus cauda cuneiformi, uropygio tectricibuſque caudæ apice coccineo ſtriatis.
Dubious Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 73. No. 11.

HABITATIO dubia: longit. poll. 8.—*roſtrum* & *pedes* flavi: *cauda* valde cuneata.

6.
L.
robuſtus. L. cinereo-cæruleus, capite collo remigibus faſciaque caudæ nigris.
Robuſt Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 74. No. 12.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine corporis ultra *Excubitorem*: longit. poll. 21.:—*caput*, *collum*, & initium *pectoris* nigra: *caudæ* elongata verſus apicem tænia lata nigra.

7.
L.
erectus. L. vireſcens ſubtus flavicans, capite tumido colloque nigris, roſtro pedibuſque flavis.
Erect Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 74. No. 13.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *caput* pennis elongatis tectum, unde criſta erecta: *caput* ultra oculos utrinque & *cervix* nigra: at *gula* & totum corpus ſubtus flaveſcens.

8.
L.
frontatus. L. criſtatus fuſcus, ſubtus flavus, capite colloque nigris, lateribus vittis duabus albis.
Frontal Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 75. No. 14. tab. 122.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Collurionis*: *roſtrum* validum nigrum: *caput* tumidum pennis erectis: linea alba a fronte utrinque deſcendens lateribus maxillæ: altera pone oculum.

L. corpore

9. L. flavigaſter. L. corpore ſupra fuſco ſubtus flavo, capite ſupra roſtro pedibuſque nigris.
Yellow-bellied Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 75. No. 15.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Excubitoris*: *caput* ſubcriſtatum, ultra oculos nigrum: *cauda* ſubcuneiformis.

10. L. rubiginoſus. L. ferrugineus ſubtus flaveſcens, ſincipite ſubcriſtato. genis maculatis.
Lanius ferrugineus, *Act. de la Soc. D'Hiſt Nat. de Paris*, v. i. part i. p. 911.
Ruſty Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 75. No. 16.

HABITAT in *Cayana*: *corpus* totum ſupra ſaturate ferrugineum, ſubtus flaveſcens: *remiges* intus nigræ: *ſincipitis* pennæ elongatæ ferrugineæ: *occiput* & *genæ* maculatæ.

11. L. Afer. L. niger ſubtus albus, dorſo maculato, linea ſuboculari albo, medio alarum macula rufo-alba.
African Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 76. No. 17.

Habitat in *Senegala*: magnitudo *L. Nævii*, cui ſimilis, at diſtincta avis: linea alba a naribus utrinque ſub oculis ducta fere ad nucham.

12. L. myſtaceus. L. fuſcus, corpore ſubtus caudaque rubris, faſcia pectoris ſtrigaque ſub oculis albis.
La Pie grieſche rouge à plaſtron blanc, *Levaill. Oiſ.* ii. p. 55. pl. 65.
Muſtachoe Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 76. No. 18.

MAGNITUDO *Merulæ*: longit. poll. 10.:—*cauda* elongata cuneiformis: *remiges* 2 majores intermediæ extus rubræ: *roſtrum* & *pedes* nigricantes in nonnullis: *remiges* 2 extus albæ.

13. L. pendens. L. niger, corpore ſupra cinereo, abdomine vittaque ſupra infraque oculos alba.
Le Pendeur, *Levaill. Oiſ.* ii. p. 58. pl. 66. 1.
Cruel Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 77. No. 19.

HABITAT in *India*, magnitudine *Lan. Rutili*: *vertex*, *nucha*, *dorſum* cæruleo-griſea: *abdomen* album: *cauda* cuneiformis, *rectricibus* 4 intermediis nigris, reliquis albo nigroque dimidiatis.

14. L. Superciliosus. L. rufus ſubtus albidus, ſtriga per oculos nigra, ſuperciliis albis.
Le Rouſſeau, *Levaill. Oiſ.* ii. p. 60. pl. 66. f. 2.
Supercilious Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 77. No. 20.

HABITAT in inſula *Java*, magnitudine *Rutili*: *corpus* ſupra ferrugineo-rufum: *ſinciput* album ſupra oculos in linea ductum, per oculos vitta nigra: *corpus* totum ſubtus rufo-albidum: *remiges* nigræ: *cauda* cuneiformis.

15. L. Brubru. L. niger, corpore ſupra albo vario ſubtus albo, ſuperciliis albis, lateribus ferrugineis.
Le Brubru, *Levaill. Oiſ.* ii. p. 85. pl. 71. f. 1. 2.
Cape Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 78. No. 21.

HABITAT *C. Bonæ Spei* interioribus: longit. poll. 5 ½.:—in mimoſis nidificat, ova ponens 5 alba fuſco maculata: *femina* fuſca ubi *mas* niger.

16. L. Cubla. L. niger, corpore ſubtus faſcia tectricum uropygioque albis, cauda apice alba.
Le Cubla, *Levaill. Oiſ.* ii. p. 89. pl. 72. f. 1. 2.
Hottniqua Shrike, *Gen. Syn. Sup.* i. p. 79. No. 23.

HABITAT in *Africa*, ad *Cap. B. Spei*: longit. poll. 6.:—victitat inſectis, larvis, pupis: *femina* magis obſcura ad fuſcum inclinans.

GENUS V. PSITTACUS.

1. Pſ. Tabuenſis. P. macrour. viridis, capite collo corporeque ſubtus coccineis, uropygio cæruleo.
Var. γ.
Tabuan Parrot, *White's Journ.* tab. p. 168. 169.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 82. No. 2. β.

HABITAT

HABITAT in *Nova Hollandia:* magnitudo & habitus *Pſ. Tabuenſis:* *cauda* elongata at vix cuneata.

2. Pſ. Narciſſus. P. macrour. luteus, collari albido, capite maculaque axillari coccineis.
Jonquil Parrakeet, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 83. tab. 123.

HABITAT in *Bengala*, magnitudine *Pſ. Rufiroſtris:* *caput* rubro-coccineum: *collare* albidum poſtice dilute viride: *corpus* totum læte flavum: *remiges* apice pallidæ: macula axillaris coccinea: *roſtrum & pedes* obſcure carnei.

3. Pſ. pallidus. P. macr. flavus, alis albidis roſaceo leviter tinctis, vireſcenteque pro luce variatis.
Pſittacus pallidus, *Nat. Miſc.* pl. 258.
Pale Parrakeet, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 84. No. 6.

4. Pſ. eximius. P. macrour. viridis, capite collo criſſoque coccineis, tectricibus alarum cæruleis, gula alba.
Pſittacus eximius, *Nat. Miſc.* pl. 93.
Nonpareil Parrot, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 85. No. 8.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Pſ. Pennantii:* *dorſi* pennæ medio macula nigra notatæ: *humeri* nigri: *tectrices alarum* minores pallide cæruleæ.

5. Pſ. pulchellus. P. macr. viridis ſubtus luteus, capiſtro aliſque cæruleis.
Pſittacus Pulchellus, *Nat. Miſc.* pl. 96.
Turcoſine Parrakeet, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 89. No. 14.

HABITAT in *Nova Hollandia:* *caput* pallide cæruleum, *nucha* fuſceſcente: *alæ* totæ cæruleæ, axillis coccineis: *cauda* valde elongata.

6. Pſ. diſcolor. P. macrour. viridis, rectricibus baſi ferrugineis, humeris ſubtus ſanguineis.
Red-ſhouldered Parrakeet, *Phill. Voy.* i. p. 269.—*White's Journ.* tab. p. 263.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 90. No. 15.

HABITAT

Habitat in *Nova Wallia Auſtrali*, magnitudine *Pſ. Pullarii*: long. poll. 10½.:—*facies* tota cum *gula* coccinea: *vertex* cæruleus: *cauda* valde cuneiformis baſi caſtanea apice cæruleſcente.

7. Pſ. pyrrhopterus.

P. ſubmacr. viridis, vertice cæruleſcente, humeris tectricibuſque alarum inferioribus aurantiis.

Orange-winged Parrakeet, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 90. No. 16.

Habitat in *Braſilia*: long. 7—8 poll.—*roſtrum* nigrum: *pedes* pallidi.

8. Pſ. nigricollis.

P. macrour. viridis, collo ſubtus nigro, loris lineaque lateribus colli albis.

Black-necked Parrakeet, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 90. No. 17.

Habitat in *Braſilia: ſinciput & orbitæ* ſulphureæ: *gula & pectus* nigra: lateribus colli linea longitudinalis alba: *remiges & rectrices* nigræ marginibus cæruleis.

9. Pſ. verticalis.

P. macrourus viridis, vertice medio rubro, remigibus cæruleis.

Red-topped Parrot, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 369.

Habitat in *Nova Hollandia*: long. poll. 18.—nimis affinis *Pſittaco Pacifico*, at multo major.

10. Pſ. funereus.

P. brachyur. niger, cauda medio melina nigro imbuta.

Pſittacus funereus, *Nat. Miſc.* pl. 186.

Bankſian Cockatoo, Var. A. *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 91. No. 18. C.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *Pſ. Bankſii*, cujus forte varietas: *cauda* non coccinea nigro faſciata, ſed melina, punctulis parvulis nigris creberrimis irrorata.

11. Pſ. Levaillanti.

P. viridis varius, humeris femoribuſque aurantiis.

Levaillant's Parrot, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 95. No. 28.

Habitat ad *Cap. Bonæ Spei*: magnitudine *Pſ. Erythroleuci.*

12. Pf. solitarius. P. brach. viridis, abdomine purpureo-cæruleo, capite collo corporeque subtus coccineis.
Solitary Parrot, *Gen. Syn. Sup.* i. p. 65.

HABITAT in insulis *Maris Pacifici*, magnitudine *Sturni*: *rostrum* & *pedes* flavescentes: *cauda* brevis.

13. Pf. galeatus. P. brachyur. cristatus fusco viridis, vertice rubro, abdomine rubro viridique undulato.
Red-crowned Parrot, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 369.

HABITAT in *Nova Hollandia*: magnitudo *Pf. Eritheci*: long. poll. 13.: — *rostrum* flavescens: *pedes* obscuri: *femina*, uti *mas*, *vertice* cristato minime rubro: *corpus* ei coloribus magis splendentibus undulatum.

GENUS IX. BUCEROS.

1. B. Abyssinicus. B. Abyssinicus, *Ind. Orn.* i. p. 143. 4.
Abba Gumba, *Bruce's Trav.* v. iii. p. 102. & *App.* tab. p. 169.
Abyssinian Hornbill, *Gen. Syn.* i. p. 347. 4.—*Id. Sup.* ii. p. 99. No. 1.

HABITAT in *Abyssinia*: long ped. 3. poll. 10. lat. ped. 6.:—nidificat in arboribus, victitat scarabæis, an eadem avis cum *B. Africano*.

2. B. ruber. B. ruber, capite nigro, fascia dorsali alba.
Crimson Hornbill, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 100. No. 4.

SPECIES dubia, magnitudinis incertæ: *rostrum* elongatum validum versus apicem incurvum nigricans, basi albidum: *pedes* nigricantes: *caput* nigrum, tumidum: *corpus* cum alis & *cauda* rubrum, fascia dorsi ante alas alba: *cauda* cuneiformis.

3. B. galeatus. B. fronte gibbosa subquadrata, corpore nigro, abdomine caudaque cuneiformi albis, fascia rectricum nigra.

Buceros galeatus, *Ind. Orn.* i. p. 142. 2.
Helmet Hornbill, *Gen. Syn.* i. p. 343. 2.—*Id. Sup.* ii. p. 370.

HABITAT in *Aſia*: *pedes* robuſti, nigri.

GENUS XI*. MUSOPHAGA.

Roſtrum craſſum, trigonum, mandibula ſuperiore baſi ſupra verticem elevata, maxillis dentatis.
Nares in medio roſtri.
Lingua integra craſſiuſcula.
Pedes ambulatorii.

M. violacea. M. cæruleo-atra, ſtriga aurium alba, roſtro remigibuſque ſanguineis.
Muſophaga violacea, *Schr. d. Berl. Geſell.* ix. S. 16. taf. 1. *D. Iſert.*
Cuculus regius, *Muſ. Lev.* pl. in p. 167.
Violet Plantain-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 104. tab. cxxv.

HABITAT in *Africa, Guinea*: long. poll. 19.:—*roſtrum* flaviſſimum, maxillis utrinque dentatis apice coccineum: *loræ* violaceæ: ſub oculis linea albida: *collum*, *pectus*, *corpus* violaceum: *alæ* violaceæ: *remiges* primariæ medio utrinque purpureo-coccineæ: *cauda* elongata cuneiformis: *pedes* nudi, nigri.

GENUS XIII. CORVUS.

1. C. melanops. C. cinereus, facie juguloque nigris, rectricibus lateralibus apice nigris.
Black-faced Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 371.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Glandarii*: *roſtrum* nigrum: *pedes* cæruleſcentes: *corpus* cæruleo-cineraſcens: *remiges* nigricantes.

C. cineraſcens

2. C. melanogaſter. C. cineraſcens, corpore ſubtus albo, facie jugulo pectore margine alarum remigibus rectricibuſque nigris.
Black-breaſted Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 371.

HABITAT in *Nova Hollandia:* an præcedentis varietas?

3. C. Caledonius. C. niger, cauda cuneiformi, collo toto pectoreque albis.
Magpie of New Caledonia, *D'Entrec. Voy.* ii. p. 226. pl. 35.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 116. No. 19.

HABITAT in *Nova Caledonia:* longit. poll. 20.:—*roſtrum* nigrum apice flaveſcens: *cauda* valda cuneiformis.

4. C. verſicolor. C. cæruleo-fuſceſcens rubro varians, cauda cuneiformi apice alba.
Variable Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 117. No. 21.

HABITAT in *Nova Hollandia:* ſpecioſa avis & inter majores numeranda: *corpus* fuſceſcens rubro & cæruleo ſplendens: *roſtrum* validum & *pedes* nigri.

5. C. cyanoleucus. C. cyaneo alboque varius, roſtro pedibus remigibuſque fuſcis.
Blue and white Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 117. No. 22.

HABITAT in *Nova Wallia Auſtrali*, magnitudine *Picæ: facies* cum *gula*, latera colli, tectrices alarum interiores, *uropygium*, *cauda* fere tota, & *corpus* inferius alba: *caput* ſuperius, *nucha*, *dorſum*, *alæ*, & *rectrices* verſus apicem nigro-cærulea: *irides* fuſcæ.

6. C. melanoleucus. C. niger, gula uropygio criſſo remigibus rectricibuſque exterioribus medio nigris.
Black and white Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 117. No. 23.

HABITAT in *Nova Wallia Auſtrali:* long. poll. 20.:—*irides* cæruleæ.

7. C. olivaceus. C. olivaceus, capite & corpore ſubtus nigris, macula aurium pectoriſque albis,
White-cheeked Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 118. No. 24.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *caput* tumidum: *remiges* ferrugineæ: *cauda* cuneiformis rectricibus extimis apice albis.

8. C. rufigaſter. C. cæruleo-niger, cauda cuneiformi, abdomine criſſo & femoribus carneis.
La Pie à Culotte de Peau, *Levaill. Oiſ.* ii. p. 20. p. 55.
Rufous-bellied Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 118. No. 25.

HABITAT in partibus meridionalibus, magnitudine *Merulæ*: *cauda* cuneiformis valde elongata: *abdomen* & *femora* carneo-rufa: *roſtrum* & *pedes* nigricantes.

9. C. varians. C. ſericeo-niger viridi-purpureo varius, cauda cuneiformi elongata.
Le Temia, *Levaill. Oiſ.* ii. p. 22. pl. 56.
Changeable Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 119. No. 26.

HABITAT in *Java*, magnitudine *Turdi muſici*: *corpus* totum plumis nigris tectum, viridi & purpureo pro luce variantes: *cauda* valde elongata, *rectricibus* 4 intermediis æqualibus, exterioribus gradatim brevioribus.

10. C. Paradoxus. C. fuſco-griſeus ſubtus albidus, abdomine medio flavo, lateribus colli caruncula cylindracea.
Corvus paradoxus, *Daudin. Orn.* ii. p. 246. pl. xvi.
Wattled Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 119. No. 27.

HABITAT in *Nova Zealandia*: longit. poll. 15.:—*roſtrum* nigrum: *gula* alba: *cauda* cuneiformis: *remiges* & *rectrices* apice albæ.

GENUS XIV. CORACIAS.

1. C. Sagittata. C. corpore ſtriato, ſupra olivaceo ſubtus albo, genis cineraſcentibus.
Striated Roller, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 122. No. 4.

HABITAT

HABITAT in *Nova Wallia Auſtrali:* longit. poll. 15.:—*remiges* ſecundariæ griſeæ, majores nigræ: *cauda* cinerea: *roſtrum* carneum: *pedes* cærulei.

2. C. Tibicen. C. niger, nucha tectricibus alarum criſſo caudaque (excepto apice) albis.
Piping Roller, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 122. No. 5.

HABITAT in *Nova Wallia Auſtrali:* long. poll. 18.:—*roſtrum* apice incurvum, cæruleum apice nigro: *pedes* cinerei.

3. C. militaris. C. coccinea, remigibus caudaque ſubtus nigricantibus.
Coracias militaris, *Muſ. Lev.* p. 61. tab. in pag. 63.
Crimſon Roller, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 122. No. 6.

HABITAT in *Cayana*, magnitudine *Corvi: roſtrum* rubrum: *pedes* nigricantes: pulcherrima avis.

4. C. piloſa. C. teſtacea ſtriis longitudinalibus albis, dorſo fuſco, remigibus caudaque cæruleis.
Hairy Roller, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 123. No. 7.

MAGNITUDINIS incertæ hæc avis: habitat forte in *Africa: roſtrum* & *pedes* cæruleſcentes: *dorſum* & *alæ* purpureo ſplendentes: ſupra oculos ſtria alba, per oculos nigra: pennæ abdominis ſtriatæ elongatæ.

5. C. ſcutata. C. nigra, jugulo pectoreque coccineis.
Coracias ſcutata, *Muſ. Lev.* p. 197. tab. p. 199.
Red-breaſted Roller, *Lev. Muſ.* p. 199. pl. p. 199.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 123, No. 8.

HABITAT in *Nova Wallia Auſtrali:* long. poll. 18.:—*cauda* rotundata: *roſtrum* nigricans ſubtus pallidum: *pedes* nigri.

6. C. pacifica. C. viridis, capite caſtaneo, alis caudaque cæruleis, remigibus baſi albis.
Pacific Roller, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 371.

Habitat in *Nova Hollandia*: long. poll. 9.:—*roſtrum* & *pedes* rubri: *gula* cærulea, lateribus albo marginata.

Genus XV. ORIOLUS.

O. Cartagenenſis.

O. fuſco rufoque varius, corpore ſubtus uropygioque flavis, capite nigro, ſuperciliis gulaque albis.
Coracias Cartagenenſis, *Scop. Ann.* i. p. 40.
Carthagena Oriole, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 126. No. 5.

Habitat in *Cartagena*, magnitudine *Or. Galbulæ*: *alæ caudaque* rufæ nigro maculatæ; *roſtrum* nigrum.

Genus XVI. GRACULA.

1. G. Abyſſinica.

G. viridis, abdomine ferrugineo, capite cineraſcente.
Abyſſinian Grakle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 128. 4.

Habitat in *Abyſſinia*: an var. *Grac. Atthis.*

2. G. viridis.

G. viridi-olivacea ſubtus albida, gula abdomineque maculis fuſcis, cauda apice alba.
Green Grakle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 129. 5.

Habitat in *Nova Hollandia*: long. poll. 11.:—*roſtrum* apice ſubincurvatum corneum: *lingua* ſubulata.

3. G. melanocephala.

G. griſeo-cæruleſcens ſubtus alba, capite nigro, fronte faſciaque tectricum albis,
Black-headed Grakle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 129. 6.

Habitat in *Nova Hollandia*: long. poll. 9.:—*roſtrum* & *pedes* flavi.

G. corpore

4. G. picata. G. corpore ſuperiore faſciaque pectorali nigris, ſubtus faſciaque duplici alarum albis.
Pied Grakle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 130. 7.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 10.:—*roſtrum* flavum: *pedes* griſei: *facies* tota cum *gula* alba.

G. cyanotis. G. viridis ſubtus alba, vertice nigro poſtice albo, regione oculorum & aurium cæruleis
Blue-eared Grakle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 130. 8.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. 11 ½. poll.:—*roſtrum* & *pedes* nigri: *gula* & *jugulum* medio cæruleo-griſea.

GENUS XVIII. TROGON.

1. T. Leverianus. T. violaceus viridi-aureo nitens, alis nigris, abdomine albo, remigibus tribus exterioribus nigris apice albis.
Trogon Leverianus, *Muſ. Lev.* p. 175. tab. p. 177.
Leverian Curucui, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 131.

HABITAT in *America Auſtrali*, magnitudine *Tr. violacei*, cui nimis ſimilis.

GENUS XX. CUCULUS.

1. C. cupreus. C. aureo-cupreus, abdomine femoribuſque flavis.
Cuculus cupreus, *Muſ. Lev.* t. in p. 159.
Cupreous Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 134.

HABITAT in *Africa*, magnitudine fere *Alaudæ*: *corpus* ſupra & *collum* plumis cupreis & verſicoloribus tectum, ſubtus cum pectore pulchre flavum: *cauda* longiuſcula, *rectricibus* exterioribus ad apicem macula triangulari notatis: *roſtrum* & *pedes* nigri.

2. C. clamoſus. C. ex toto fuſco-nigricans.
Cuculus criard, *Levaill. Voy.* (ed. 8vo.) ii. p. 6.
Noiſy Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 136. No. 7.

HABITAT *Capitis B. Spei* interioribus: cantus varius & continuo repetitus longe auditur.

3. C. cyanocephalus. C. maculatus ſupra fuſcus ſubtus albus, capite colloque ſupra nigro-cyaneis, gula rufa.
Blue-headed Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 137. No. 8.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longit. poll. 9.:—*roſtrum & pedes* cæruleſcentes: *dorſum* maculis albidis notatum: latera abdominis lineis tranſverſis nigris.

4. C. phaſianinus. C. niger, corpore ſupra caudaque rufo flavo nigroque variis, rectricibus elongatis.
Pheaſant Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 137. No. 9.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longit. poll. 18.:—*corpus* variegatum: *cauda* elongata faſciis numeroſis: *ungues* poſtici elongati fere recti.

5. C. palliolatus. C. corpore vireſcente ſubtus albo, lateribus colli tænia obliqua nigra.
Tippet Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 138. No. 10.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longit. poll. fere 12.:—*vertex* ſubcriſtatus: *caput* ad oculos uſque nigrum: *cauda* brevis, *rectricibus* extus albo maculatis.

6. C. flabelliformis. C. cauda cuneiformi, corpore nigro ſubtus fulvo, rectricibus lateralibus intus nigro albeque faſciatis.
Fan-tailed Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 138. No. 11. tab. 126.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Turdi: caput, corpus* ſuperius, alæque nigra: *roſtrum* nigrum: *pedes* flavi.

C. rufo

7. C. plagosus. C. ruso-purpureus, subtus albidus tæniis transversis fusco-auratis, rostro pedibusque flavis.
Glossy Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 138. No. 12.
HABITAT in *Nova Hollandia: rostrum* fuscum: *pedes* pallidi.

** Pedibus tridactylis.

8. C. Abyssinicus. C. fuscus subtus albidus, remigibus rectricibusque apice albis, pedibus tridactylis.
Bee Cuckow, Moroc, *Bruce's Trav. App.* t. p. 178.
Abyssinian Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 139. No. 13.
HABITAT in *Abyssinia:* longit. poll. 7.:—victitat apibus.

GENUS XXII. PICUS.

1. P. icterocephalus. P. olivaceo-fuscus, capite flavo, pileo rubro, corpore subtus albido fasciis interruptis fuscis.
Yellow-headed Woodpecker, var.? *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 141. No. 5. Var.

AN varietas *Pic. Icterocephali: gula* tota maculis rubescentibus notata.: *corpus* subtus maculis subincurvatis fuscis.

2. P. altivolans. P. fusco-ruber, pileo gulaque cæruleo-viridibus, lateribus colli flavo variis.
Picus altivolans ex Guinea, *Ger. Orn.* ii. p. 49. t. 173.
Guinea Woodpecker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 141. No. 6.

HABITAT in *Guinea:* hujus avis præter imaginem & nomen non aliam in *Geriniana* ornithologia invenimus notitiam: affinis *Galbulæ*.

3. P. Mahrattensis. P. niger albo varius, subtus fuscus maculatus, uropygio albo, abdomine medio rubro.
Mahratta Woodpecker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 142. No. 7.

HABITAT in *India: Pic. Minore* paulo major: *corpus* subtus a *gula* fuscum maculis saturatioribus: *remiges* & *rectrices* nigræ albo maculatæ.

P. rufus

4.
P. pectoralis. P. rufus nigro undulatus, abdomine rufescente nigro maculato, fascia pectorali nigra.
Gorget Woodpecker, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 372.

Habitat in *Nova Zealandia:* long. poll. 9.:—*cauda* nigra.

Genus XXIV. ALCEDO.

A. azurea. A. saturate cærulea, corpore subtus lorisque flavescentibus, lateribus colli macula obliqua alba.
Azure King's-fisher, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 372.

Habitat in insula *Norfolk Maris Pacifici:* magnitudo *Ispidæ: rostrum* nigrum: *pedes* rubri.

Genus XXV. SITTA.

S. chrysoptera. S. cinerea subtus albida, alis caudaque fuscis, remigibus medio aurantio-ferrugineis.
Orange-winged Nuthatch, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 146. 3.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *S. Surinamensis: rostrum* fuscum: *pedes* plumbei.

Genus XXVI. TODUS.

T. Rubecula. T. cinereus, gula pectoreque aurantiis, abdomine albo.
Red-breasted Tody, *Gen Syn. Sup.* ii. p. 147. 2.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *Emb. Citrinellæ: vertex* subcristatus: *rostrum* obscurum, basi vibrissis instructum: *lingua* bifida.

GENUS XXVII. MEROPS.

1. M. superbus. M. ruber, fronte gula uropygioque cæruleis, rectricibus duabus intermediis longioribus.
Merops superbus, *Nat. Misc.* tab. 78.
Superb Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 152. 6.

HABITAT in *America Australi?* longit. poll. 9.:—*M. Brasilienſi* valde affinis.

2. M. orientalis. M. viridis, rectricibus mediis elongatis, remigibus rubris apice nigris.
Eaſtern Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 152. 7.

HABITAT in *India*, magnitudine *Erythropteri*.

3. M. cæruleſcens. M. cæruleo-viridis nigro varians.
Blue-green Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 152. 8.

HABITATIO dubia: longit. poll. 8.:—*pedes* nigri.

4. M. cucullatus. M. fuſco-plumbeus ſubtus albidus fuſco lineatus, cucullo verticali per oculos ducto nigro.
Hooded Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 152. 9.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longit. 9.—10. poll.:—*roſtrum* & *pedes* flaveſcentes: *abdomen* album: *remiges* 5—6 intermediæ medio viridi-flavicantes: *cauda* plumbea apice albida.

5. M. chryſopterus. M. fuſcus, macula alarum fulva, remigibus rectricibuſque exterioribus apice albis.
Golden-winged Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 153. 10.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longit. poll. 12.:—*cauda* cuneiformis fuſca: *roſtrum* & *pedes* nigri: victitat *inſectis, melle*.

6.
M.
auritus. M. corpore ſupra ruſo ſubtus albido, ſtriga pone oculos remigibus rectricibuſque nigris.
Black-eared Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 153. 11.

HABITAT in *Nova Hollandia:* long. poll. 7.:—*roſtrum* & *pedes* fuſci.

7.
M.
phrygius. M. niger flavo varius, macula per oculos rectricibuſque exterioribus flavis.
Black and yellow Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 154. 12.—*New Holland Birds*, pl.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Turdi*: *roſtrum* nigrum: *pedes* fuſci: color pennarum niger marginibus flavis: latera capitis macula magna flava: *cauda* cuneiformis, *rectricibus* 2 intermediis toto-nigris margine flavis, exterioribus flavis.

8.
M.
cyanops. M. fuſcus ſubtus albus, capite ſupra gulaque nigris, macula oculari cyanea.
Blue-cheeked Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 154. 13.

HABITAT in *Nova Hollardia:* long. poll. 16.:—*genæ* cæruleæ: *roſtrum* nigrum: *pedes* cærulei.

9.
M.
garrulus. M. fuſcus ſubtus albus, faſcia verticis nigra, macula pone oculos remigibuſque magna ex parte flavis.
Chattering Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 154. 14.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Turdi*: *roſtrum* & *pedes* flavi: *cauda* cuneiformis: inquieta & garrula avis.

10.
M.
Monachus. M. ſupra fuſcus ſubtus albus, capite ſubtomentoſo nigro, vertice elevato.
Cowled Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 155. 15.

HABITAT in *Nova Hollandia: roſtrum* validum ſubincurvatum nigrum: *pedes* cærulei: *vertex* & *nucha* tomentoſo-ſetacea.

11. M. ornatus. M. cæruleo viridique varius, nucha gula remigibuſque baſi fulvis, rectricibus duabus elongatis.
Variegated Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 155. 16. tab. 128.

Habitat in *Nova Hollandia: Erythroptero* major: per oculos vitta lata nigra, ſubtus cærulea: *gula* macula triangulari nigra: *corpus* ſubtus flavum: *roſtrum* & *pedes* nigri.

12. M. albifrons. M. ruſus ſubtus albidus, capite ſupra nigro, fronte nivea, remigibus rectricibuſque maculatis.
White-fronted Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 156. 17.

Habitat in *Nova Hollandia:* longit. poll. 9.:—*corpus* ſubtus album, lineis abbreviatis obſcuris: *remiges* & *rectrices* obſcure cæruleæ, margine albo maculatæ: *roſtrum* & *pedes* fuſci.
Femina fuſca ſubtus fuſco-albida.

13. M. gularis. M. niger, fronte uropygioque cæruleis, abdomine cæruleo maculato, gula rubra.
Merops gularis, *Nat. Miſc.* pl. 337.
Red-throated Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 157. 18.

Habitat in *Africa*, magnitudine *Apiaſtri: gula* ſplendide rubra: *remiges* majores baſi ferrugineæ.

Genus XXIX. CERTHIA.

1. C. coccinigaſtra. C. viridi-aurea, pectore purpureo-amethyſtino coccineo vario, abdomine nigro, faſciculo ſubaxillari flavo.
Crimſon-bellied Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 164. 18.

Habitat in *Africa:* longit. poll. 5 ½.:—affinis *C. Politæ.*

2. C. venuſta. C. viridi-aurea, gula purpureo-atra, abdomine pallide flavo.
Certhia venuſta, *Nat. Miſc.* 10. tab. 369.
Læona Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 164. 19.

Habitat in *Africa*: longit. poll. 4.:—fascicula axillaris flava ut in *C. coccinigastra*.

3. C. Mahrattensis. C. violaceo-purpurea, remigibus rectricibusque exterioribus nigricantibus, fasciculo subaxillari flavo.
Mahratta Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 164. 20.

Habitat in *India*: affinis *C. Asiaticæ*.

4. C. melanops. C. fusca subtus alba, fascia per oculos ad latera pectoris utrinque nigra.
Black-eyed Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 165. 21.

Habitat in *Nova Wallia Australi*: longit. poll. 7—8.:—*frons* alba: variat fronte fusca loris nigris; fascia sub oculis nigra.

5. C. tenuirostris. C. dorso cinereo, abdomine rufo, capillitio lunula gulæ remigibus rectricibusque nigris.
Slender-billed Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 165. 22. tab. 129.

Habitat in *Nova Hollandia*: longit. ultra poll. 6.:—*rostrum* tenue, elongatum, modice incurvum: *lingua* setacea: lunula *gulæ* nigra intus rufa: *corpus* subtus album: victitat *insectis, melle*.

6. C. leucophæa. C. olivaceo-fusca subtus albida, vertice nigro transversim lineato, pone oculos macula flava.
Dirigang Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 166. 23.

Habitat in *Nova Hollandia*: magnitudo *C. familiaris*: macula flava infra & pone oculum, altera aurantia.

7. C. pipilans. C. fusco-virescens subtus flavicans, femoribus albo fuscoque fasciatis, remigibus rectricibusque fuscis.
Chirping Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 166. 24.

Habitat in *Nova Hollandia*: magnitudo *Lusciniæ*: vox pipilans: *rostrum* gracile: *lingua* setacea.

C. nigra

8.
C.
mellivora. C. nigra lunulis ſtriiſque albidis, tectricibus alarum medio rufis, cauda apice albida.
Mellivorous Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 166. 25.

Habitat in *Novæ Hollandiæ* maritimis, magnitudine *Turdi:* ſpecies numeroſa: inquieta avis & pugnax, victitans *Muſcis, Melle.*
Pſittaco Hæmatod. valde infeſta.

9.
C.
atricapilla. C. fuſco-viridis ſubtus albida, vertice geniſque nigris.
Black-headed Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 167. 26.

Habitat in *Nova Hollandia:* long. poll. 6.:—*roſtrum* modicum: *lingua* ſetacea.

10.
C.
ſanguinolenta. Certhia coccineo-ſanguinea, dorſo maculis deformibus nigris, ſubtus cinerea, gula juguloque albis.
Sanguineous Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 167. 27.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *Sylviæ: roſtrum* & *pedes* nigri: *lingua* apice ſetacea.

11.
C.
dibapha. C. coccineo-rubra, abdomine albo, maculis dorſi pectoris per oculos alis caudaque nigris.
Cochineal Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 167. 28.

Habitat in *Nova Hollandia:* magnitudo *C. Cruentatæ:* medio pectoris maculæ 6 nigræ: *alæ, cauda, roſtrum* & *pedes* nigri: *lingua* ſetacea.

12.
C.
caneſcens. C. griſeo-cinerea ſubtus rufo-alba, pectore roſeo-purpuraſcente, remigibus rectricibuſque obſcuris.
Hoary Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 168. 29.

Habitat in *Nova Hollandia:* long. poll. 8.:—*roſtrum* nigrum: *lingua* apice ſetacea: *tectrices alarum* albo maculatæ.

13. C. pyrrhoptera.

C. cinerea ſubtus alba, macula aurium ſulva ſubtus nigra, remigibus medio rectricibuſque exterioribus flavis.
Yellow-winged Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 168. 30.

Habitat in *Nova Hollandia*: long. poll. 7.:—*remiges* majores a baſi ultra medium flavæ: *uropygium* flaveſcens: *lingua* ſetacea.
Femina ſupra cinereo-griſea ſubtus flaveſcens, criſſum maculis ferrugineis: *remiges* a baſi ad medium pallide ferrugineæ: victitat inſectis.

14. C. agilis.

C. fuſca ſubtus alba, vertice nucha colloque ſupra nigris.
Agile Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 168. 31.

Habitat in *Nova Hollandia*: longit. poll. 6.:—*roſtrum* nigrum: *lingua* apice ſetacea: victitat *melle*, *inſectis*.

15. C. cæruleſcens.

C. fuſca ſubtus incarnata, gula juguloque griſeo-cæruleis, remigibus rectricibuſque cæruleo-nigris.
Cærulean Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 169. 32.

Habitat in *Nova Hollandia*: magnitudo *Sylviæ*: *roſtrum* tenue obſcurum.

16. C. chryſotis.

C. cinereo-fuſca ſubtus alba, macula pone aures ovata aurea, alteraque, ſuperius nigra.
Yellow-eared Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 169. 33.

Habitat in *Nova Hollandia*: magnitudo *Fringillæ*: *lingua* ſetacea.

17. C. erythropygia.

C. fuſca ſubtus albida, uropygio ſtrigiſque maxillaribus rubris.
Red-rumped Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 169. 34.

Habitat in *Nova Hollandia*: *roſtrum* & *pedes* nigri: *lingua* apice ſetacea: ſolitaria & rara avis.

C. viridis

18. C. nigrifrons. C. viridis ſubtus flava, fronte geniſque nigris.
Black-fronted Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 169. 35.

HABITAT in *Africa ? cauda* cuneiformis.

19. C. frontalis. C. obſcura, vertice dorſoque fuſceſcentibus, gula uropygioque cæruleis.
Blue-faced Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 372.

HABITAT in *Africa:* long. poll. 5.:—*roſtrum* & *pedes* nigri.

GENUS XXX. TROCHILUS.

1. T. criſtatellus. T. curviroſtris viridis, capitis criſta viridi-nitente aurea, remigibus caudaque nigris.
Gilt-creſted Humming Bird, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 171. 4.

PARVA ſpecies, longit. 2½. poll.:—*nidus* pappoſus ut in congeneribus.

Femina ſupra viridi-fuſca, ſubtus albida maculis pectoralibus nigricantibus.

2. T. fulvifrons. T. curviroſtris ſaturate cæruleus, abdomine nigro, facie margine alarum caudaque ſubtus fulvis.
Orange-faced Humming Bird, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 172. 5.

HABITATIO dubia: longit. poll. 3¼.:—*roſtrum* rectum apice aduncum, albidum. *caput* poſtice ſubcriſtatum: *corpus* nigricans cæruleo varium: *abdomen* nigricans: macula *lori*, *gulaque* fulva: *pedes* nigri.

3. T. maximus. T. viridi-aureus, gula nivea, criſſo ferrugineo, vertice remigibus caudaque cæruleſcentibus.
Trochilus maximus, *Muſ. Leſk.* No. 76. t. ii. No. 2.
Great Humming Bird, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 172. 6.

HABITATIO dubia: longit. poll. 8.:—*roſtrum* capite longius: *gula* nivea: *cauda* ſubulata nigricans.

ORDO III. PASSERES.

GENUS XXXII. TURDUS.

1. T. gularis. T. fuſcus ſubtus albus, criſſo flaveſcente, faſcia pectorali obſcura.
Penrith Ouzel, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 177. 2.

HABITAT in *Cumbria: Cinclo* paulo major: *pectus, abdomen,* & *femora* lineis abbreviatis nigris

2. T. inquietus. T. corpore ſupra nigro ſubtus albo, roſtro pedibuſque nigris.
Reſtleſs Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 181. 11.

HABITAT in *Nova Wallia Auſtrali:* magnitudo *Turdi muſici:* longit. poll. 8.:—*roſtrum* nigrum, apice ſubincurvatum: *cauda* apice integra.

3. T. melanops. T. ferrugineo-fuſcus, ſubtus cum vertice flavus, per oculos macula longitudinali nigra, intus ad imum macula parva flava.
Black-eyed Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 181. 12.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longit. poll. 8.:—*roſtrum* nigrum: *lingua* apice ſetacea.

4. T. dubius. T. nigro-cæruleſcens ſubtus albus, remigibus rectricibuſque fuſcis.
Doubtful Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 182. 13.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longit. poll. 9.:—*roſtrum* cæruleſcens: *lingua* apice ſetacea: *corpus* ſupra cæruleo-nigricans, ſubtus album: *rectrices* elongatæ: *pedes* fuſci.

5. T. dilutus. T. pallide fuſcus ſubtus cæruleo-albus, capite collo uropygioque griſeo-cæruleſcentibus.
Dilute Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 182. 14.

HABITAT

HABITAT in *Nova Hollandia: roſtrum* pallide fuſcum: *pedes* cærulei.

6. T. gutturalis. T. viridis ſubtus luteus, capite nigro, gula alba.
Guttural Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 182. 15.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. Zeyloni: roſtrum* & *pedes* nigri: *nucha* flaveſcens.

7. T. harmonicus. T. pallide fuſcus ſubtus albidus, remigibus rectricibuſque obſcuris.
Harmonic Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 182. 16.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longit. poll. 9.:—*pennæ* corporis inferioris ſcapis fuſcis: *remiges* & *rectrices* nigricantes: *roſtrum* & *pedes* cornei.

8. T. badius. T. badius ſubtus albidus, vertice cæruleſcente, pectore nebuloſo, remigibus rectricibuſque plumbeis.
Port Jackſon Thruſh, *White's Voy.* pl. in p. 157.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 183. 17.

HABITAT in *Nova Hollandia: roſtrum* flavum: *pedes* fuſci: *cauda* elongata apice integra.

9. T. praſinus. T. cinereo-cæruleus ſubtus flaveſcens, macula aurium ovata nigra.
Praſine Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 183. 18.

HABITAT in *Nova Hollandia:* magnitudo *Turdi muſici: roſtrum* & *pedes* nigricantes: *tectrices* alarum nigro maculatæ: *gula* alba: *cauda* tota nigra.

10. T. volitans. T. ſupra niger ſubtus albus, alis fuſcis, capite colloque nigris.
Volatile Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 183. 19.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longit. poll. 9.:—*roſtrum* nigrum: *cauda* elongata apice integra.

11. T. cyanous. T. viridis ſubtus niveus, cauda rotundata, macula oculari cærulea.
Blue-cheeked Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 184. 20.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longitud. poll. 12.:—*roſtrum* & *pedes* cæruleo-nigricantes: latera capitis cærulea.

12. T. tenebroſus. T. dorſo alis gulaque nigris, corpore ſubtus albido, vertice fuſco.
Brown-crowned Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 184. 21.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longitud. poll. 6.:—*roſtrum* cæruleſcens: *pedes* nigri: *vertex* & latera corporis fuſca.

13. T. lunulatus. T. lunulis nigris notatus, ſupra fuſcus ſubtus albidus, roſtro nigro, pedibus pallidis.
Lunulated Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 184. 22.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. viſcivori: lingua* apice ſetacea: *cauda* brevis.

14. T. fuliginoſus. T. fuſco-obſcurus, collo anteriore pallide griſeo, pectore maculis obſcuris notato.
Sooty Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 185. 23

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. muſici: Lingua* apice acuto: color corporis ſuperioris obſcure viridi-fuſcus: *cauda* integra: *pedes* flavi.

15. T. melanophrys. T. flavo-fuſcus, loris elevatis, roſtro macula pone oculos pedibuſque rubris.
Black-browed Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 185. 24.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. fuliginoſi: lora* elevata rigida flava nigro marginata: *roſtrum* & *pedes* rubri.

T. capite

16.
T.
Muſcicola. T. capite collo ſuperiore dorſoque nigris, corpore ſubtus albo, alis caudaque fuſcis.
Flycatching Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 185. 25.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longit. poll. 10.:—victitat *Muſcis.*

17.
T.
cyanocephalus. T. ſupra fuſcus ſubtus flaveſcens, vertice ſaturate cæruleo, rectricibus margine albo maculatis.
Blue-headed Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 185. 26.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. muſici: roſtrum* cæruleum apice nigro: *rectrices* apice albæ: *hypochondria* lineis tranſverſis numeroſis notata: *cauda* rotundata: *pedes* cærulei.

18.
T.
maxillaris. T. fuſcus ſubtus cæruleo-albus, vertice faſciaque maxillari albis.
Maxillary Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 186. 27.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. muſici: mucha* obſcura cærulea: *cauda* integra, apicibus rectricum albis: *roſtrum* fuſcum: *pedes* flavi.

19.
T.
frivolus. T. fuſcus ſubtus rufo-albidus, fronte cinereo alboque varia.
Frivolous Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 186. 28.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. muſici: cauda* modica potius abbreviata: *roſtrum* nigrum: *pedes* plumbei.

20.
T.
ſordidus. T. cinereo-vireſcens, alis caudaque nigris, macula remigum alba, rectricibus exterioribus apice albis.
Sordid Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 186. 29.

HABITAT in *Nova Hollandia: roſtrum* cæruleſcens: *rectrices* 2 intermediæ cinereo-fuſcæ, reliquæ albæ.

21.
T.
brachypterus. T. cauda cuneiformi elongata, corpore cinereo-fuſco, alis abbreviatis.
Short-winged Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 187. 30.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. muſici:* longit. poll. 10.:—*corpus* ſupra pallide fuſcum, ſubtus cineraſcens: *pectus* nebuloſum: *alæ* abbreviatæ vix ad caudæ baſin attingunt: *roſtrum* & *pedes* nigricantes.

22. T. melinus. T. fuſco-vireſcens ſubtus albus, abdomine flavo, ſuperciliis albis, capite & cervice nigris.
Yellow-bellied Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 187. 31.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. viſcivori: roſtrum* & *pedes* rubri: *lingua* ſetacea: *gula, collum* anterius & *criſſum* alba: *pectus* & *abdomen* olivaceo-flava: latera pectoris maculis ſagittatis notata.

23. T. punctatus. T. fuſcus nigro punctatus, ſubtus cæruleo-albus, ſuperciliis albis, ſub oculis macula rufa.
Punctated Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 187. 32.

Habitat in *Nova Hollandia: roſtrum* nigrum: *pedes* flavi: *gula* alba: *abdomen* ruſo-album: latera ſub *alis* & *criſſum* ſtrigis abbreviatis nigris.

24. T. aſiaticus. T. niger ſubtus flavus, faſcia alarum duplici alba.
Aſiatic Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 188. 33.

Habitat in *Sina:* longitud. poll. 6.:—*roſtrum* & *pedes* nigri: *caput* ultra oculos & *corpus* ſuperius nigra.

25. T. polioce-phalus. T. obſcurus, capite colloque canis.
Aſh-headed Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 373.

Habitat in inſula *Norfolk Maris Auſtralis:* long. 7 ½. poll.

26. T. leucotis. T. viridis ſubtus flavus, vertice caneſcente, jugulo pectoreque nigris, macula aurium alba.
White-eared Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 373.

Habitat cum *T. melanope*, cujus forte ſexus alter.

T. niger,

27. T. leucophrys. T. niger, ſuperciliis abdomine maculaque alarum albis, femoribus albo maculatis.
White-browed Thruſh, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 373.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *roſtrum* & *pedes* nigri.

GENUS XXXV. LOXIA.

1. L. Javenſis. L. fuſco cinerea, capillitio remigibus ac rectricibus nigris, temporibus abdomineque cinereo-albicantibus.
Loxia javenſis, *Muſ. Carlſ. faſc.* iv. t. 88.
Sunda Groſbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 195. 9.

HABITAT in *Sumatra* & *Java*, magnitudine *L. Pyrrhulæ*: *roſtrum* validum nigricans: *pedes* flavicantes: *abdomen* ac *criſſum* alba.

2. L. cinerea. L. fuſco-nigricans, capite criſtato, abdomine albido, pedibus rubris.
Loxia cinerea, *Muſ. Carlſ. faſc.* iv. t. 88.
Aſh-coloured Groſbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 196. 10.

HABITAT in inſulis *Malacca*, *Sumatra*, *Java*: *roſtrum* conico-ovatum album apice nigrum: *corpus* ſubtus album: *irides* rubræ: *criſta* roſtro duplo longior: *alarum* remiges 1. 2. 3. 4. anteriores fere æquales: *cauda* rotundata, *rectricibus* margine exteriore albidis: *pedes* rubri.

3. L. ferruginoſa. L. ferruginea, roſtri baſi jugulo macula abdominis alarum apice pedibuſque nigris, capillitio ac cervice albicantibus. Mas.
Loxia ſupra ferruginea ſubtus cinerea, roſtro & pedibus nigris, remigibus rectricibuſque ferrugineo-fuſcis. Femina.
Ferruginous Groſbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 196. 11.

HABITAT in *India Orientali*: *roſtrum* cinereum ſubtus nigrum: *caput* & *cervix* cinereo-albida: *gula jugulum* cum parte pectoris ſuperiore fuſco-nigra: *remiges* nigricantes: *cauda* brevis, ſordide ferruginea: *pedes* atri.

Femina

Feminæ mentum, gula, tempora cinereo-albicantia: *jugulum* cinereum: cæterum ut in *mare*.

4. L. frontalis. L. cinereo-grisea subtus alba, vertice & cervice rufescentibus.
Loxia frontalis, *Daudin. Orn.* ii. p. 445.
Frontal Grosbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 196. 12.

Habitat in *Senegala*, magnitudine *Fr. Amandavæ: rostrum & pedes* pallide grisei: *pennæ* sinciput & rictum oris tegentes ferratæ nigræ apice albæ.

5. L. mystacea. L. fusco-olivacea subtus albida, capite & cervice rufo-fuscis, superciliis & macula oris coccineis.
Loxia mystacea, *Daudin. Orn.* ii. p. 446.
Mustachoe Grosbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 197. 13.

Habitat in *Cochin Sina*, magnitudine *Reguli:* longit. vix pollic. 4.: —*rostrum* rufo-fuscum apice nigro: supra oculos tænia splendide coccinea & macula ejusdem ad rictum oris: *pedes* carnei.

6. L. cyanoptera. L. cinereo-fusca, capistro saturatiore, alis & cauda cæruleis, remigibus exterioribus basi albis.
Blue-winged Grosbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 197. 14.

Habitat in *Nova Wallia Australi*, longitudine pollic. 7.:—*rostrum* & *pedes* cærulei: *remiges* saturate cæruleæ, exteriores basi albæ, unde macula alarum: *rectrices* apice albæ.

7. L. fascinans. L. fusco-nigra subtus alba, rectricibus exterioribus albis.
Fascinating Grosbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 197. 15.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *Pyrrhulæ: rostrum & pedes* nigricantes.

8. L. bella. L. grisea nigro transversim lineata, loris nigris, rostro uropygioque rubris.
Black-lined Grosbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 198. 16.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Linariæ*: *corpus* griſeo-fuſcum lineis tranſverſis numeroſis nigris: inter *roſtrum* & *oculum* macula nigra, quæ circumdat oculum & definit in acutum: *pedes* pallide fuſci.

9. L. nitida. L. lineolis tranſverſis interruptis nigris notata, corpore ſupra fuſco ſubtus albido, roſtro uropygioque rubris.
Nitid Groſbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 198. 17. tab. 131.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *L. bellæ*: *roſtrum*, *irides*, *uropygium* rubra: *pedes* flaveſcentes.

GENUS XXXVII. TANAGRA.

1. T. flavifrons. T. viridis, fronte lutea, capillitio violaceo, roſtro pedibus alis caudaque nigris.
Emberiza flavifrons, *Muſ. Carlſ.* iv. tab. 92.
Yellow-fronted Tanager, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 204. 2.

Gula flavo-viridis: confer *Tan. Cayanam.*

2. T. rudis. T. roſtro jugulo pedibus fuſco-cinereis, pectore abdomine criſſo ac uropygio ferrugineo-rufis, reliquis fuſco-nigris.
Tanagra rudis, *Muſ. Carlſ.* iv. tab. 94.
Rude Tanager, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 205. 3.

HABITAT in *India Orientali.*

3. T. ornata. T. ſubtus cinereo-nitens ſupra fuſco-vireſcens, capillitio cervice & humeris violaceis, macula alarum aureo-lutea.
Tanagra ornata. *Muſ. Carlſ.* iv. tab. 95.
Showy Tanager, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 205. 4.

HABITAT in *India Orientali*: magnitudo & habitus *T. Sayacu.*

GENUS

GENUS XXXVIII. FRINGILLA.

1. F. leucocephala. F. fuſco-rufa, capite albo, uropygio rubro, faſcia pectoris lunulaque ante oculos nigris.
White-headed Finch, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 210. 12. tab. 132.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Pyrrhulæ*: *roſtrum* rubrum: *caput* & *collum* totum alba: ante oculos lunula nigra: *abdomen* medium album: latera corporis nigra maculis parvis albis: *pedes* pallidi.

Variat capite cineraſcente, an ſexus alter.

2. F. calida. F. fuſco-rufa, corpore ſupra ſtriis longitudinalibus nigris, pedibus pallidis.
Sultry Finch, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 210. 13.

HABITAT in *India*: longit. poll. 5 ½.:—*roſtrum* nigricans: *pennæ* corporis ſuperioris & *verticis* medio ſtriis nigris notatæ: *cauda* apice integra: *pedes* pallide flavi.

3. F. nitida. F. cineraſcens ſubtus albida, remigibus ferrugineo-flaveſcentibus, ſupercilliis nigris.
Nitid Finch, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 211. 14.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Cælebis*: *roſtrum* rubrum: latera corporis flaveſcentia: ſupra oculos faſcia nigra poſtice dilatata: *pedes* flavi.

4. F. temporalis. T. fuſca ſubtus alba, vertice cæruleſcente, genis uropygioque coccineis.
Temporal Finch, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 211. 15.

HABITAT in *Nova Hollandia?* regio oculorum macula ovata coccinea notata, poſtice dilatata: *roſtrum* & *pedes* rufo-fuſci.

GENUS XXXIX. PHYTOTOMA.

* Pedibus tetradactylis.

1. P. Rara. P. tetradactyla griseo-obscura, remigibus rectricibusque albo maculatis.
Phytotoma rara, *Ind. Orn.* i. 4. 466. 1.—*Molin. Chil.* (Fr. ed.) p. 234.
—*Daudin. Orn.* ii. p. 366. 1.
Chili Plant-cutter, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 212.

HABITAT in *Chili.*

** Pedibus tridactylis.

2. P. Abyssinica. P. tridactyla nigra, capite gula juguloque rubris.
Phytotoma tridactyla, *Daudin. Orn.* ii. p. 366. 2.
Loxia tridactyla, *Ind. Orn.* i. p. 397. 93.
Le Guifso Balito, *Buf. Oif.* iii. p. 471.
Three-toed Grosbeak, *Gen. Syn.* iii. p. 159.
Abyssinian Plant-cutter, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 213. tab. 133.

HABITAT in *Abyssinia*, *Nubia*, magnitudine *Coccothraustis:* longit. pollic. 6 : - *caput* & *collum* antice rubra : *corpus* cum *alis* & *cauda* nigrum : *humeri* fusco-virescentes: *tectrices* alarum majores marginibus albidis : *cauda* forficata : *pedes* tridactyli fusci, digitis 2 anticis, 1 postico.

In ave a *Buffonio* descripta *caput*, *collum*, & *abdominis* medium usque ad crissum, rubra.

GENUS XL. MUSCICAPA.

1. M. auricomis. M. olivacea, vertice corpore subtus maculaque aurium flavis, per oculos striga alba.
Yellow-tufted Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 215. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*, satis numerosa.

2. M. auſtralis. M. cinerea, corpore ſubtus & ſuperciliis flavis.
Southern Motacilla, *White's Voy.* tab. p. 239.
Southern Flycatcher, *Gen. Syn.* ii. p. 219. 13.

HABITAT in *Nova Hollandia.*

3. M. ſuperci-lioſa. M. fuſca, abdomine cineraſcente, gula rectricibuſque ferrugineis, ſuperciliis albis.
Muſcicapa ſupercilioſa, *Muſ. Carlſ.* iv. tab. 96.
Supercilious Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 220. 14.

MAGNITUDO *Turdi minoris: rectrices* 2 intermediæ fuſcæ, reliquæ ferrugineæ apicibus fuſcis.

4. M. Meloxan-tha. M. cinerea ſubtus flava, vertice alis caudaque nigris, rectricibus apice albis.
Muſcicapa Meloxantha, *Muſ. Carlſ.* iv. tab. 97.
Black-crowned Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 220. 15.

PARVA ſpecies: tectrices alarum & remiges marginibus flavis: *caput* ſuperius nigrum.

5. M. rufifrons. M. fuſca, fronte dorſo baſique caudæ rufis, remigibus nigris, auribus pectoreque nigro maculatis.
Rufous-fronted Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 220. 16.

HABITAT in *Nova Wallia Auſtrali:* magnitudo *Luſciniæ: cauda* elongata, ſubcuneiformis.

6. M. coccini-gaſtra. M. olivacea, gula alba, pectore abdomineque coccineis, fronte nigra, remigibus rectricibuſque albo nigroque dimidiatis.
Crimſon-bellied Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 221. 17. tab. 134.

HABITAT in *Nova Hollandia:* 5½. poll. longa:—*roſtrum* & *pedes* fuſceſcentes.

M. fuſca

7.
M.
barbata. M. fuſca ſubtus alba, vertice maculaque gulari nigris.
Black-cheeked Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 221. 18.

HABITAT cum priore: *remiges* margine flaveſcentes; *cauda* elongata.

8.
M.
myſtacea. M. virens ſubtus flava, tænia a rictu oris ſub oculis nigra.
Muſtachoe Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 221. 19.

HABITAT in *Nova Hollandia:* 8—9. poll. longa: *roſtrum* gracile & *pedes* nigri: *lingua* apice laciniata.

9.
M.
rhodoptera. M. ſubcriſtata fuſca ſubtus alba, remigibus medio rectricibuſque a baſi ultra medium roſeis.
Roſe-winged Flycatcher, *Gen. Syn. Sup*, ii. p. 222. 20.

HABITAT in *Nova Hollandia:* magnitudo *Luſciniæ: occiput* poſtice ſubcriſtatum maculis nigris.

10.
M.
crepitans. M. criſtata atro-cinerea, cauda ſubcuneiformi, gula ſtriis tranſverſis albis.
Coach-whip Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 222. 21.

HABITAT in *Nova Hollandia:* magnitudo *Turdi: roſtrum* nigrum: *irides* cæruleæ.

11.
M.
pectoralis. M. flavo-vireſcens ſubtus flava, capite lateribus colli faſciaque pectoris nigris, gula juguloque albis.
Black-breaſted Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 222. 22.

HABITAT in *Nova Hollandia:* ultra 8 poll. longa:—*tectrices* alarum margine flavæ: *cauda* nigra apice flavo.

12.
M.
cucullata. M. nigra ſubtus alba, remigibus albo marginatis, roſtro capiteque nigris.
Hooded Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 223. 23

HABITAT in *Nova Hollandia: caput* tumidiuſculum.

13. M. rhodogaſtra. M. fuſca ſubtus pallida, pectore roſeo, tectricibus alarum albido marginatis.
Roſe-breaſted Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 223. 24.

Habitat in *Nova Hollandia: roſtrum* elongatum.

14. M. flavigaſtra. M. cineraſcens ſubtus flava, remigibus rectricibuſque obſcuris.
Grey Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. 223. 25.

Habitat in *Nova Hollandia.*

15. M. malachura. M. fuſca ſubtus ferruginea, gula cærulea, cauda longa cuneata rectricibus pinnulis disjunctis.
Soft-tailed Flycatcher, *Lin. Tranſ.* iv. p. 240. pl. 21.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 224. 26.

Habitat in *Novæ Hollandiæ* arundinetis: 7 poll. longa: *gula feminæ & junioris avis* cum *pectore* ferruginea.

16. M. melanocephala. M. capite colloque nigris, dorſo fulvo, corpore ſubtus albo maculis nigris, alis caudaque fuſcis.
Orange-rumped Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 225. 27.

Habitat in *Nova Hollandia: caput & collum* tumidiuſcula: *caudam* frequenter gerit expanſam erectam.

17. M. cochinſinenſis. M. olivaceo-fuſca ſubtus rufeſcens, cauda cuneata, rectricibus tribus exterioribus apice albo nigroque maculatis.
Cochin Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 374.

Habitat in *Cochin Sina*: long. poll. 4 ¾.:—*roſtrum* fuſcum: *pedes* pallidi.

GENUS XLI. ALAUDA.

1. A. Gorensis. A. nigro-maculata ferrugineo-fusca subtus ferruginea, abdomine albo, cauda nigricante, rectricibus extimis oblique albis.
Ferruginous Lark, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 229.

GENUS XLII. MOTACILLA.

1. M. atricapilla. M. fusco-rubra subtus alba, vertice remigibusque nigris, rectricibus fuscis flavescente dimidiatis.
Black-crowned Wagtail, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 231. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *M. albæ: rostrum & pedes* flavi.

2. M. cæruleſcens. M. pallide cærulea, subtus flavescens, alula alba, remigibus rectricibusque nigris.
New Holland Wagtail, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 232. 5.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *M. Boarulæ.*

GENUS XLIII. SYLVIA.

1. S. sylvicola. S. virescens subtus flavescens, superciliis luteis, abdomine crissoque niveis.
Motacilla Sibilatrix, *Naturf.* xxvii. p. 47. 4.
Regulus non cristatus major, *Brisſ. Orn.* iii. p. 482. A.—*Ind. Orn.* ii. p. 550. *δ.*—*Will. Orn.* p. 164.—*Ray's Letters*, p. 108. *Gen. Syn.* iv. p. 514. E.
Larger Yellow Wren, *White's Selb.* p. 55.
Wood Wren, *Lin. Transſ.* ii. p. 245. pl. 24.—*Id.* iv. p. 35.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 237. 6.

HABITAT

Habitat in *Europa*, *Anglia*: 5½ poll. longa: *roſtrum* corneum: *irides* avellaneæ: excelſos arbores frequentat: nidificat in terra, *ova* ponens alba maculis minutis ferrugineis.

2. S. anilis. S. fuſceſcens ſubtus albida, criſſo flavo, iridibus rubris.
Yellow-vented Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 247. 28.

Habitat in *Nova Hollandia*: *roſtrum* & *pedes* fuſci.

3. S. fagittata. S. nigro ſagittato-ſtriata, corpore ſupra fuſco ſubtus albo, vertice nigro ſtriis albis, per oculos vitta ferruginea.
Streaked Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 247. 29.

Habitat in *Nova Hollandia*, egregie cantillans: magnitudo *S. modularis*.

4. S. inornata. S. flavo-fuſceſcens ſubtus flava, remigibus nigris, cauda apice pallida.
Terrene Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 248. 30.

Habitat in *Nova Hollandia*.

5. S. chryſops. S. rufo-fuſca ſubtus alba, genis nigris, ſub oculis ſtriga flava.
Black-cheeked Warbler. *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 248. 31.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *Paſſeris*: *lingua* apice laciniata.

6. S. rufiventris. S. cinereo-fuſca, abdomine rufo, jugulo albo, lunula pectoris cærulea.
Rufous-vented Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 248. 32.

Habitat in *Nova Hollandia*, præcedente paulo major.

7. S. flavigaſtra. S. cinereo-fuſca, corpore ſubtus uropygioque flavo, loris nigris.
Gold-bellied Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 249. 33.

Habitat cum præcedente.

+ S. cinereo-

8. S. rubricata. S. cinereo-fuſca ſubtus toto ferrugineo-rubra, alis caudaque fuſcis.
Ruddy Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 249. 34.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *roſtrum* gracile: *pedes* flavi: *irides* avellaneæ.

9. S. caſta. S. fuſco-ferruginea ſubtus flaveſcens, pectore cæruleo-nebuloſo, ſuperciliis obſcuris.
Chaſte Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 249. 35.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Rubeculæ*.

10. S. leucophæa. S. fuſca ſubtus albo-cæruleſcens, macula remigum rectricibuſque (2 intermediis exceptis) albis.
White-tailed Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 249. 36.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

11. S. rubricollis. S. cærulea ſubtus alba, jugulo pectoreque coccineo-rubris.
Crimſon-breaſted Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 250. 37.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

12. S. lateralis. S. griſeo-cæruleſcens ſubtus albida, alis uropygio rectricibuſque lateralibus viridibus, loris nigris.
Ruſty-ſided Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 250. 38.

HABITAT in *Nova Hollandia*, parva ſpecies magnitudine *Troglodytis*: *latera* corporis ferruginea.

13. S. hirundinacea. S. corpore ſupra nigro, jugulo pectoreque coccineis, abdomine albo ſtriga longitudinali nigra, criſſo fulvo.
Motacilla hyrundinacea, *Nat. Miſc.* iv. pl. 114.
Swallow Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 250. 39.

HABITAT

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine præcedentis, cujus forte varietas.

14. S. versicolora.

S. fusco-nebulosa subtus albo-cæruleſcens, rectricibus 2 intermediis fuscis, lateralibus rubris apice albis.
Variable Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 250. 40.

Habitat in *Nova Hollandia*.

15. S. flammea.

S. supra flammea subtus grisea, alis caudaque nigris.
Motacilla flammea, *Mus. Carls.* iv. tab. 98.
Flame-coloured Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 251. 41.

Habitat in *Palmis Javæ*, magnitudine *Reguli*: *rostrum* & *pedes* nigri.

16. S. Pusilla.

S. fusca subtus pallida, cauda prope apicem fascia fusca.
Motacilla Pusilla, *White's Journ.* pl. in p. 257.
Dwarf Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 251. 42.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine & habitu *S. cyaneæ*, cui valde affinis.

Genus XLIV. PIPRA.

1. P. punctata.

P. grisea fusco undulata, vertice alisque nigris albo punctatis, tectricibus caudæ rubris.
Speckled Manakin, *Nat. Misc.* t. 111.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 253. 4.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine congenerum: *pectus* rubescens: per oculos vitta albida.

2. P. superciliosa.

P. castaneo-rufa subtus flavescens, superciliis albidis supra nigro marginatis, rectricibus albo maculatis.
Supercilious Manakin, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 253. 5.

Habitat

Habitat in *Nova Hollandia : cauda* brevis nigra, *rectricibus* 2 intermediis latere, lateralibus apice albis.

3. P. cærulea. P. ſupra cærulea ſubtus flaveſcens, vertice remigibus caudaque nigricantibus.
Cærulean Manakin, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 254. 6.

Magnitudo præcedentis : *roſtrum* & *pedes* fuſci.

4. P. caudata. P. cærulea, vertice ſubcriſtato coccineo, alis nigris, rectricibus 2 intermediis elongato-acuminatis.
Long-tailed Manakin, *Nat. Miſc.* pl. 153.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 254. 7.

Habitat in *America Meridionali*, magnitudine & forma *P. Pareolæ :* latera *colli* & *caudæ* viridi-ſplendentia : *roſtrum* fuſcum : *pedes* pallidi.

5. P. gularis. P. nigro-cærulea ſubtus coccinea, abdomine albo.
Crimſon-throated Manakin, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 254. 8.

Habitat in inſulis *Maris Pacifici, Huaheine:* magnitudo *Pipræ erythrocephalæ : roſtrum* pallidum : *pedes* obſcuri.

6. P. pectoralis. P. cæruleo-nigra, abdomine ferrugineo, lunula pectoris aurea.
Gold-breaſted Manakin, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 374.

Habitat in *Braſilia :* long. poll. 4. :—*roſtrum* & *pedes* pallidi.

Genus XLVI. HIRUNDO.

1. H. caudacuta. H. obſcura viridi-nitens, fronte gulaque albida, rectricibus apice ſubulatis.
Needle-tailed Swallow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 259. 3.

Habitat in *Nova Hollandia.*

2. H. pacifica. H. obſcura, gula & uropygio cæruleo-albidis, rectricibus apice acutis.
New Holland Swallow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 259. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*, præcedenti affinis?

3. H. javanica. H. nigricans cæruleo nitens ſubtus cineraſcens, fronte gula juguloque ferrugineis, rectricibus lateralibus apice macula alba.
Hirundo javanica, *Muſ. Carlſ.* iv. t. 100.
Javan Swallow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 259. 5.

HABITAT in *Java*: nidificat in terra.

GENUS XLVII. CAPRIMULGUS.

1. C. vittatus. C. albidus, dorſo cæruleo nebuloſo, vertice faſciaque nuchæ nigris, remigibus rectricibuſque ferrugineo-fuſcis.
Banded Goatſucker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 262. 3. pl. 136.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

2. C. ſtrigoides. C. ferrugineo-fuſcus, ſupra ſtriis maculiſque obſcuris, ſubtus lineis fuſcis, faſciis tectricum tribus pallidis, ſuperciliis albis.
Strigoid Goatſucker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 262. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

3. C. megacephalus. C. cinereus maculis ſtriiſque pallidis, abdomine ferrugineo, remigibus rectricibuſque albo maculatis.
Great-headed Goatſucker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 263. 5.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

4. C. gracilis. C. cinereo fuſco alboque varius, ſubtus albidus ſtriis maculiſque ferrugineo-flavis, cauda elongata.
Gracile Goatſucker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 263. 6.

HABITAT

HABITAT in *Nova Hollandia*: *corpus* gracile: *roſtrum* validum: *irides* & *pedes* flavi.

5. C. forficatus. C. cauda forficata, corpore nigro fuſco rufo alboque vario, mandibula ſuperiore medio crenata.
Engoulevent à queue fourchue, *Levaill. Oiſ.* i. p. 178. pl. 47. 48.
Fork-tailed Goatſucker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 264. 7.

HABITAT in *Africa*, magnitudine *Strigis ululæ*: longit. poll. 26.:—*rictus* ampliſſimus: *cauda* valde cuneiformis: *roſtrum* nigrum: *pedes* flavi.

6. C. macrodipterus. C. griſeo varius, alis rufo fuſcoque maculatis, penna utrinque humerali denudata longiſſima.
Caprimulgus macrodipterus, *Afzel. Deſcr. Sierr. Leon.* tab. in ditto.
Leona Goatſucker, *Nat. Miſc.* pl. 265.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 264. 8.

HABITAT in *Africa*, magnitudine *C. europæi*.

ORDO IV. COLUMBÆ.

GENUS XLVIII. COLUMBA.

1. C. melanoleuca. C. viridi-nigricans, ſubtus alba maculis nigris, vertice cinereo, pone oculos macula triquetra rubra.
White-faced Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 268. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*, *Turture* major: *facies* ultra oculos alba ante oculos macula nigra, pone oculos macula rubra.

2. C. picata. C. albo nigroque varia, facie alba, abdomine albo maculis nigris, cauda apice alba.
Pied Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 268. 5.

HABITAT cum præcedente, cujus forte varietas.

3. C. Abyſſinica. C. olivaceo-viridis, abdomine flavo, macula alarum purpurea, femoribus albis nigro maculatis.
Waalia Pigeon, *Bruce's Trav.* iv. p. 282. 290.—*Id. App.* tab. p. 186. —*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 269. 6.

HABITAT in *Abyſſinia, Waalia,* magnitudine *domeſticæ,* affinis *C. Pompadoræ.*

4. C. meridionalis. C. rubro-fuſca, tectricibus alarum minoribus purpureo-nigris, rectricibus lateralibus apice albis.
Southern Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 270. 7.

HABITAT in *Nova Hollandia,* magnitudine *Turturis: cauda* brevis cuneiformis, *rectricibus* 2 intermediis nigro-fuſcis, faſcia verſus apicem nigra.

5. C. pallida. C. albo-vireſcens, capite cineraſcente, remigibus minoribus nigro maculatis, rectricibus lateralibus apice albis.
Pale Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 270. 8.

HABITAT in *Nova Hollandia.*

6. C. Norfolcienſis. C. atro-purpurea, capite colloque albis, abdomine remigibuſque nigris. Mas.
C. fuſco-purpurea, dorſo viridi, capite collo pectoreque ferrugineis. Femina.
Norfolk Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 374.

HABITAT in inſula *Norfolk Maris Auſtralis:* long. poll. 14.: *roſtrum* nigrum: *pedes* rubri.

7. C. ſpadicea. C. capite colloque viridi-aureo rubentibus, humeris ſpadiceis, dorſo aliſque cæruleſcentibus, abdomine albo.
Cheſnut-ſhouldered Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 375.

HABITAT cum præcedente: long. poll. 20.:—*roſtrum* & *pedes* rubri.

8. C. cuneata. C. cauda cuneata fuſceſcens, alis albo maculatis, capite collo pectoreque pallide griſeis.
Grey-necked Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 375.

Habitat in *Nova Hollandia:* long. poll. 8.:—*cauda* valde cuneiformis, *rectricibus* apice acutis, 2 intermediis griſeis, reliquis ultima medietate albis.

Genus LIII*. MENURA.

Roſtrum validum, conico-convexum, baſi nudiuſculum.
Nares ovatæ medio roſtri.
Rectrices elongatæ pinnulis diſtinctis, intermediæ duæ longiores anguſtæ, exteriores ad apicem patulæ revolutæ.
Pedes robuſti, ambulatorii.

1. M. N. Hollandiæ. New Holland Menura, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 271*. tab. 136*.

Habitat in *Nova Hollandia*, a roſtro ad apicem rectricum long. ped. 3½.:—*roſtrum* baſi nudiuſculum nigrum, *corpus* rufo-fuſcum ſubtus cineraſcens: *gula* rufa: *rectrices* prælongæ, *ſcapis* a baſi ad medium binis, pinnulis disjunctis diſtantibus; intermediæ 2 anguſtæ albidæ longiſſimæ; exteriores baſi modicæ, verſus apicem revolutæ, pinnulis interioribus multo latioribus lunulis diaphanis ferrugineis, apice nigræ: *pedes* validi, obſcure nigri, unguibus modice incurvatis.

Femina minor, capite lævi, 35 poll. longa: color totius avis fuſcus: *cauda* cuneiformis, *rectricibus* pinnulis conjunctis.

Genus LIV. PHASIANUS.

1. Ph. ignitus. Ph. niger chalybeo-nitens, lateribus corporis rufis, dorſo imo igneo-ferrugineo, rectricibus intermediis ſubfulvis.
Fire-backed Pheaſant, *Emb. to China*, i. p. 246. tab. 13.—*Nat. Miſc.* tab. 321.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 274. 2.

Habitat in *Java?* magnitudine *Galli: pedes* calcari valido acuto inſtructi: *caput* poſtice ſubcriſtatum.

Genus

GENUS LVII. PERDIX.

** Pedibus tetradactylis muticis.

1. P. coronata.

MAS.

Columba criſtata, *Ind. Orn.* ii. p. 596. 10.
Phaſianus criſtatus, *Muſ. Carlſ. faſc.* iii. t. 64.
Le Roloul de Malacca, *Son. Voy. Ind.* ii. p. 174. t. 100.
Uncommon Bird from Malacca, *Phil. Tranſ.* lxii. p. i. tab. 1.
Violaceous Partridge, *Nat. Miſc.* pl. 84.
Leſſer crowned Pigeon, *Gen. Syn.* iv. p. 622. 10. tab. 58.—*Id. Sup.* ii. p. 278. 4.

FEMINA.

Tetrao viridis, *Ind. Orn.* ii. p. 650. 22.
Green Partridge, *Gen. Syn.* iv. p. 777. 21. t. 67.—*Id. Sup.* ii. p. 278. 4.

HABITAT in *Sumatra.*

2. P. Californica.

Perdix plumbea, criſta verticali erecta, gula nigra albo cincta, abdomine teſtaceo lunulis nigris.
Tetrao Californicus, *Nat. Miſc.* tab. 345.
Creſted Partridge of New California, *La Perouſe, Voy.* 1. p. 201 ?
Californian Quail, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 281. 7.

HABITAT in *California, Coturnice* paulo major: *femina* coloribus dilutioribus abſque lunula gulari nigra.

3. P. auſtralis.

P. lineis angularibus nigris, ſupra caſtaneo-nebuloſa ſubtus flaveſcens, gula pallida.
New Holland Quail, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 283. 10.

HABITAT in *Nova Hollandia*: 7 ½ pollices longa: *corpus* ſupra & infra angulatim nigro-lineatum, *ſcapis* pennarum albo lineatis: *roſtrum* nigrum: *pedes* fuſci.

** Pedibus

4. P. varia.

** Pedibus tridactylis.

P. tridactyla mutica, corpore cinereo rufo & nigro vario ſubtus albido, gula cineraſcente, genis punctis parvis albis, macula aurium cæruleſcente.
New Holland Partridge, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 283. 12.

Habitat in *Nova Hollandia*, *Coturnice* major: *dorſum* maculis triquetris nigris notatum: *roſtrum* corneum: *pedes* pallide flavi.

DIV. II. AVES AQUATICÆ.

ORDO VII. GRALLÆ.

GENUS LXVI. MYCTERIA.

1. M. australis. M. alba, capite colloque viridi-nigris; tectricibus pennis scapularibus caudaque nigris, rostro nigro, pedibus rubris.
Mycteria australis, *Linn. Trans.* v. p. 34. No. 2.
New Holland Jabiru, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 294. pl. 138.

HABITAT in *Nova Hollandia:* longitudo ab apice rostri ad extremos ungues pedes sex: *gula* nudiuscula, rubra.

2. M. Senegalensis. M. alba, rostro apicem versus rubro, basin versus albido fascia nigra, macula utrinque fenestrata.
Mycteria Senegalensis, *Linn. Trans.* v. p. 32. tab. 3. (caput.)
Senegal Jabiru, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 296. 3.

HABITAT in *Senegala*, magnitudine *australem* paulo excedens: *corpus* album: *caput, collum, pennæ scapulares*, & *pedes* nigra.

GENUS LXIX. ARDEA.

1. A. maculata. A. fuscescens subtus albida, dorso maculis albis, remigibus subferrugineis.
Spotted Heron, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 305. 19.

HABITAT in *Nova Hollandia:* statura *A. minutæ.*

A. corpore

2. A. pacifica. A. corpore ſupra obſcuro viridi & cupreo ſplendente ſubtus albido, capite colloque albidis.
Pacific Heron, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 305. 20.

HABITAT in *Nova Hollandia.*

GENUS LXXI. NUMENIUS.

1. N. vociferus. N. plumbeus albo maculatus, cauda cuneata, rectricibus extimis albis.
Ephouſkyca, Crying Bird, *Bart. Trav.* p. 145. 291.
Crying Curlew, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 306. 2.

HABITAT in *Georgia Americana*, magnitudine *Gallinæ.*

GENUS LXXII. SCOLOPAX.

1. S. auſtralis. S. corpore ſcolopacino, cervice nebuloſa, genis & collo albidis, lateribus corporis maculis lunatis fuſcis.
New Holland Snipe, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 310.

HABITAT in *Nova Hollandia.*

GENUS LXXIII. TRINGA.

1. T. canadenſis. T. cinereo-obſcura, jugulo cineraſcente, abdomine albo lateribus maculato, pedibus flavis.
Quebec Sandpiper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 313. 7.

HABITAT in *Canada:* magnitudo *Turdi muſici.*

2. T. lobata. T. carunculata armata olivaceo-ferruginea ſubtus alba, vertice nigro, remigibus rectricibuſque nigris.
Wattled Sandpiper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 313. 8.

Habitat in *Nova Hollandia:* 19 pollices longa: *roſtrum* pallidum: *pedes* obſcuri ſegmentis roſeis: femora roſea: ad flexuram *alæ* ſpina flava.

3. T. aurita. T. ferrugineo-cinerea lineis tranſverſis albidis, ſubtus nebuloſa pallida, ſupercilliis albis, macula aurium fuſca.
Brown-eared Sandpiper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 314.

Habitat in *Nova Hollandia.*

Genus LXXIV. CHARADRIUS.

1. C. Cantianus. C. fuſcus, fronte collari abdomineque albis, vitta per oculos lateralibuſque pectoris nigris.
Kentiſh Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 316. 3.

Habitat in *Europa, Anglia,* magnitudine & facie *Ch. Hiaticulæ,* at diſtincta avis: *vertex* fuſco-ferrugineus: *roſtrum* & *pedes* nigri.

2. C. magniroſtris. C. roſtro dilatato, corpore nigro ſtriato ſupra cæruleſcente ſubtus cineraſcente, macula remigum alba.
Great-billed Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 319. 8.

Habitat in *Nova Hollandia,* magnitudine *Ch. Pluvialis*; *roſtrum* validum, latum, nigrum: *pedes* cærulei: *frons* & *vertex* maculis minutis nigricantibus.

3. C. Grallarius. C. cæruleſcens nigro ſtriatus, ſubtus albus ſtriis fuſcis, macula aurium fuſca, pedibus longiſſimis.
High-legged Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 319. 9.

Habitat in *Nova Hollandia: roſtrum* nigrum: *pedes* cæruleſcentes.

4. C. fuſcus. C. nebuloſus ſupra fuſcus ſubtus albus, cauda nigra maculis albis.
Brown Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 320. 10.

Habitat in *Nova Hollandia: roſtrum* nigrum: *pedes* plumbei.

C. fuſcus

5. C. griseus. C. fuscus subtus albus, vertice nigro, alis albo maculatis.
Grisled Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 320. 11.

Habitat in *Nova Hollandia*: *rostrum* obscurum: *pedes* cærulescentes.

6. C. frænatus. C. cæruleſcens fusco striatus, abdomine albo, lateribus colli vitta lata obscura.
Bridled Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 320. 12.

Habitat in *Nova Hollandia*: *rostrum* cæruleſcens: *pedes* flavi.

7. C. Africanus. C. cinerascens, capite fasciaque pectoris viridibus, corpore subtus vittaque annulari verticis albidis.
Green-headed Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 320. 13.

Habitat in *Egypto*: habitus *Ch. melanocephali*: longitudo 8 pollicum: *tectrices* alarum majores albæ: *rectrices* prope apicem fascia nigra.

Genus LXXIX*. CEREOPSIS.

Rostrum breve, convexum, apice declive.
Nares cera tectæ.
Caput totum cera rugosa obtectum, ad flexuram alæ calcar obtusum.
Pedes tetradactyli fissi, femoribus seminudis, digito postico brevissimo.

1. C. N. Hollandiæ. New Holland Cereopsis, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 325. tab. 138*.

Habitat in *Nova Hollandia*, magnitudine *Anseris*: long. poll. 39.: —*rostrum* nigrum: *caput* totum ultra aures *cera*, seu cute rugosa, tectum: *plumæ* totius corporis cinereo-griseæ, subtus dilutius, maculis aliquot tectricum nigris: *cauda* rotundata *rectricibus* 16: *pedes & femora*

ſeminuda fulva, *tarſis* & *digitis* nigris: *digito* exteriore baſi membrana medio connexo, poſtico breviore vix terram attingente.

GENUS LXXX. GALLINULA.

1. G. poliocephala. G. purpurea ſubtus viridis, capite griſeo-cæruleſcente, remigibus caudaque cæruleis, criſſo albo.
Grey-headed Water Hen, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 375.

HABITAT in *India*: *roſtrum* validum rubrum ut in *Porphyrione*, cui nimis affinis: *pedes* rubri.

2. G. madagaſcarienſis. G. purpureo-fuſca ſubtus cærulea, capite griſeo-cæruleſcente, gula pectore humeriſque viridibus.
Grey-headed Water Hen, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 375.

HABITAT in *Madagaſcaria*: an ſexus alter præcedentis: *roſtrum* & *pedes* rubri.

GENUS XCIV. LARUS.

1. L. pacificus. L. fuſcus, pectore uropygioque albidis, roſtro fulvo prope apicem nigro.
Pacific Gull, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 332. 2.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

2. L. Pulocondor. L. cinereo-fuſcus ſubtus albus, occipite nigro, fronte cinerea, pedibus flavis.
Pulo-Condor Gull, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 332. 3.

HABITAT in *Mari Sinenſi*.

GENUS

GENUS XCVII. ANAS.

1.
A. melanoleuca.
A. alba, capite collo alis cauda femoribusque nigris.
Black and White Goose, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 344.

HABITAT in *Nova Hollandia:* avis speciosa: *rostrum* fulvum *cera* flava, ultra oculos protensa, obtectum: *pedes* elongati flavi, *digitis* vix ultra medium membrana connexis, fere ut in *A. Semipalmata.*

2.
A. semipalmata.
A. grisea, capite collo femoribusque fusco-nigris, collari uropygio corporeque subtus albis, pedibus semipalmatis.
Anas semipalmata, *Linn. Trans.* iv. p. 103. vi.
Semipalmated Goose, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 347. pl. 139.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Anseris: rostrum* fuscum: *pedes* rubri: *trachea* longissima circumvoluta pectus insternens, cute solum tecta: arboribus frequenter considet & sibilans uti *A. Penelope* & *arborea.*

3.
A. jubata.
A. subcristata grisea, capite colloque ferrugineis, pectore undulato, abdomine crissoque nigris.
Hawksbury Duck, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 358. tab. in titulo.

HABITAT in *Nova Hollandia:* pollices 17—18. æquans: *rostrum* & *pedes* nigri: latera abdominis nigro pulchre transversim lineata: *pennæ* pectoris maculis parvis nigris: *speculum* viride anterius & posterius album.

4.
A. membranacea.
A. ferrugineo-fusca subtus alba transversim lineata, superciliis ferrugineis, rostro apice membranaceo.
New Holland Duck, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 359. 36.

HABITAT in *Nova Hollandia:* 19 pollices longa: *rostrum* nigrum, apice dilatatum, membranaceum: *regio* oculorum & *vertex* cum *cervice* obscura.

A. tectricibus

5. A. Rhyncho-tis. A. tectricibus alarum cæruleis, corpore griseo, crisso nigro, pedibus pallidis.
New Holland Shoveler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 359. 37.

Habitat in *Nova Hollandia*: *rostrum* apice dilatatum ut in *A. discorde*; an ejusdem varietas?

Genus XCIX. PELECANUS.

1. P. sinensis. P. fuscus, gula alba, corpore subtus albido maculis fuscis, cauda rotundata.
Leu-tze, *Emb. to China*, ii. p. 388. 412. tab. 72.—*Id.* 389. tab. ad imum.
Chinese Corvorant, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 364. 3.

Habitat in *Sina* numerosissimus, ad piscium prædam adhibitus: *rostrum* flavum: *irides* cæruleæ: *cauda rectricibus* 12: *pedes* nigricantes.

CATALOGUS
NOMINUM TRIVIALIUM.

Div. I. AVES TERRESTRES.

ORDO I.
ACCIPITRES.

Genus I.
Vultur.

1. Auricularis.
2. Kolbii.
3. Jugax.
4. Californianus.

Genus II.
Falco.

1. vulturinus.
2. bellicosus.
3. occipitalis.
4. Albicilla var.
5. tigrinus.
6. Germanicus.
7. Destructor.
8. albescens.
9. ecaudatus.
10. Bacha.
11. Tachardus.
12. Chicquera.
13. Parasiticus.
14. Buzon.
15. Buzzerellus.
16. melanopterus.
17. vocifer.
18. Blagrus.
19. ranivorus.
20. testaceus.
21. ornatus.
22. Mauduyti.
23. Guianensis.
24. rufiventris.
25. hyemalis var.
26. musicus.
27. Acoli.
28. axillaris.
29. rupicolus.
30. Subbuteo major.
31. Gabar.
32. minullus.
33. tibialis.
34. Jackal.
35. Desertorum.
36. Nisus.
37. Tachiro.
38. Sonninensis.
39. melanops.
40. radiatus.
41. connivens.
42. discolor.
43. pacificus.
44. lunulatus.
45. clarus.

Genus III.
Strix.

1. palustris.
2. albifrons.
3. candida.
4. Choucou.
5. Nisuella.
6. Huhula.
7. griseata.
8. Georgica.
9. Boobook.
10. nudipes.
11. Phalenoides.
12. Tengmalmi var.
13. Sinensis.
14. undulata.

ORDO II.
PICÆ.

Genus IV.
Lanius.

1. collaris.
2. Collurio.
3. picatus.
4. torquatus.
5. dubius.
6. robustus.
7. erectus.
8. frontatus.
9. flavigaster.
10. rubiginosus.
11. Afer.
12. mystaceus.
13. pendens.
14. supercilliosus.
15. Brubru.
16. Cubla.

Genus V.
Psittacus.

1. Tabuensis var.
2. Narcissus.
3. pallidus.
4. eximius.
5. pulchellus.

5. pulchellus.
6. difcolor.
7. pyrrhopterus.
8. nigricollis.
9. verticalis.
10. funereus.
11. Levaillanti.
12. folitarius.
13. galeatus.

GENUS IX.

Buceros.

1. Abyffinicus.
2. rubér.
3. galeatus.

GENUS XI *.

Muſophaga.

1. violacea.

GENUS XIII.

Corvus.

1. melanops.
2. melanogaſter.
3. Caledonicus.
4. verſicolor.
5. cyanoleucus.
6. melanoleucus.
7. olivaceus.
8. rufigaſter.
9. varians.
10. Paradoxus.

GENUS XIV.

Coracias.

1. ſagittata.
2. Tibicen.
3. militaris.
4. piloſa.
5. ſcutata.
6. pacifica.

GENUS XV.

Oriolus.

1. Cartagenenſis.

GENUS XVI.

Gracula.

1. Abyſſinica.
2. viridis.
3. melanocephala.
4. picata.
5. cyanotis.

GENUS XVIII.

Trogon.

1. Leverianus.

GENUS XX.

Cuculus.

1. cupreus.
2. clamoſus.
3. cyanocephalus.
4. phaſianinus.
5. palliolatus.
6. flabelliformis.
7. plagoſus.
8. Abyſſinicus.

GENUS XXII.

Picus.

1. icterocephalus var.
2. altivolans.
3. Mahrattenſis.
4. pectoralis.

GENUS XXIV.

Alcedo.

1. Azurea.

GENUS XXV.

Sitta.

1. Chryſoptera.

GENUS XXVI.

Todus.

1. Rubecula.

GENUS XXVII.

Merops.

1. ſuperbus.
2. orientalis.
3. cæruleſcens.
4. cucullatus.
5. chryſopterus.
6. auritus.
7. Phrygius.
8. cyanops.
9. Garrulus.
10. Monachus.
11. ornatus.
12. albifrons.
13. gularis.

GENUS XXIX.

Certhia.

1. coccinigaſtra.
2. venuſta.
3. Mahrattenſis.
4. melanops.
5. tenuiroſtris.
6. leucophæa.
7. pipilans.
8. mellivora.
9. atricapilla.
10. ſanguinolenta.
11. dibapha.
12. caneſcens.
13. pyrrhoptera.
14. agilis.
15. cæruleſcens.
16. chryſotis.
17. erythropygia.
18. nigrifrons.
19. frontalis.

GENUS XXX.

Trochilus.

1. criſtatellus.
2. fulvifrons.
3. maximus.

ORDO III.

PASSERES.

GENUS XXXII.

Turdus.

1. gularis.
2. inquietus.
3. melanops.
4. dubius.
5. dilutus.
6. gutturalis.
7. harmonicus.
8. badius.
9. praſinus.
10. volitans.
11. cyanous.
12. tenebroſus.
13. lunulatus.
14. fuliginoſus.
15. melanophrys.
16. Muſcicola.
17. cyanocephalus.
18. maxillaris.
19. frivolus.
20. ſordidus.

20. fordidus.
21. brachypterus.
22. melinus.
23. punctatus.
24. asiaticus.
25. poliocephalus.
26. leucotis.
27. leucophrys.

GENUS XXXV.

Loxia.

1. Javensis.
2. cinerea.
3. ferruginosa.
4. frontalis.
5. mystacea.
6. cyanoptera.
7. fascinans.
8. bella.
9. nitida.

GENUS XXXVII.

Tanagra.

1. flavifrons.
2. rudis.
3. ornata.

GENUS XXXVIII.

Fringilla.

1. leucocephala.
2. calida.
3. nitida.
4. temporalis.

GENUS XXXIX.

Phytotoma.

1. Rara.
2. Abyssinica.

GENUS XL.

Muscicapa.

1. auricomis.
2. australis.
3. superciliosa.
4. meloxantha.
5. rufifrons.
6. coccinigastra.
7. barbata.
8. mystacea.
9. rhodoptera.
10. crepitans.
11. pectoralis.
12. cucullata.
13. rhodogastra.
14. flavigastra.
15. malachura.
16. melanocephala.
17. Cochinsinensis.

GENUS XLI.

Alauda.

1. Gorensis.

GENUS XLII.

Motacilla.

1. atricapilla.
2. cærulescens.

GENUS XLIII.

Sylvia.

1. Sylvicola.
2. anilis.
3. sagittata.
4. inornata.
5. chrysops.
6. rufiventris.
7. flavigastra.
8. rubricata.
9. casta.
10. leucophæa.
11. rubricollis.
12. lateralis.
13. hirundinacea.
14. versicolora.
15. flammea.
16. Pusilla.

GENUS XLIV.

Pipra.

1. punctata.
2. superciliosa.
3. cærulea.
4. caudata.
5. gularis.
6. pectoralis.

GENUS XLVI.

Hirundo.

1. caudacuta.
2. pacifica.
3. Javanica.

GENUS XLVII.

Caprimulgus.

1. vittatus.
2. strigoides.
3. megacephalus.
4. gracilis.
5. forficatus.
6. macrodipterus.

ORDO IV.

COLUMBÆ.

GENUS XLVIII.

Columba.

1. melanoleuca.
2. picata.
3. Abyssinica.
4. meridionalis.
5. pallida.
6. Norfolciensis.
7. spadicea.
8. cuneata.

GENUS LIII*.

Menura.

1. N. Hollandiæ.

GENUS LIV.

Phasianus.

1. ignitus.

GENUS LVII.

Perdix.

1. coronata.
2. Californica.
3. australis.
4. varia.

DIV. II. AVES AQUATICÆ.

ORDO VII. *GRALLÆ.*

GENUS LXVI.
Mycteria.
1. australis.
2. Senegalensis.

GENUS LXIX.
Ardea.
1. maculata.
2. pacifica.

GENUS LXXI.
Numenius.
1. vociferus.

GENUS LXXII.
Scolopax.
1. australis.

GENUS LXXIII.
Tringa.
1. Canadensis.
2. lobata.
3. aurita.

GENUS LXXIV.
Charadrius.
1. Cantianus.
2. magnirostris.
3. grallarius.
4. fuscus.
5. griseus.
6. frænatus.
7. Africanus.

GENUS LXXIX*.
Cereopsis.
1. N. Hollandiæ.

GENUS LXXX.
Gallinula.
1. poliocephala.
2. Madagascarienſis.

GENUS XCIV.
Larus.
1. Pacificus.
2. Pulo-condor.

GENUS XCVII.
Anas.
1. melanoleuca.
2. semipalmata.
3. jubata.
4. membranacea.
5. rhynchotis.

GENUS XCIX.
Pelecanus.
1. Sinensis.

FINIS.

Luke Hansard, Printer,
Great Turnstile, Lincoln's-Inn Fields

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01032 6718